

千金方治心腹脹短氣以草豆蔻一兩去皮爲末以木瓜生薑

湯下半錢

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿方厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑爲度搗篩如麵以陳米飲調下一錢七日三服良亦治反胃止瀉甚妙

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胸滿悶

不蛀皂角去皮子塗好醋炙令焦爲末一錢匕巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨爲丸如麻子大每服三丸食後

陳橘皮湯下曰三服隔一日增一丸以利爲度如常服消酒

道藏輯要

肘後備急方

云

虛集十  
四十六

食

梅師方治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中冷卽易之

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時

含一棗大嚥津

治卒霍亂諸急方第十二

凡所以得霍亂者多起飲食或飲食生冷雜物以肥膩酒鰈而當風履濕薄衣露坐或夜臥失覆之所致

初得之便務令煖以炭火布其所臥下大熱減之又並蒸被絮若衣絮自苟冷易熱者亦可燒地令熱水沃敷薄布席臥其上厚覆之亦可作灼灼爾熱湯著囊中瀆足令至膝并銅

器貯湯以著腹上衣藉之冷復易亦可以熨斗貯火著腹上如此而不淨者便急灸之但明案次第莫爲亂灸須有其病乃隨病灸之未有病莫預灸灸之雖未卽愈要萬不復死矣莫以灸不卽愈而止灸霍亂艾丸若不大壯數亦不多本方言七壯爲可四五十無不便火下得活服舊方用理中丸及厚朴大豆豉通脈半夏湯先輩所用藥皆難得今但疏良灸之法及單行數方用之有效不減於貴藥已死未久者猶可灸

餘藥乃可難備而理中丸四順厚朴諸湯可不預合每向秋月常買自隨

道藏輯要

肘後備急方

卷

虛集十  
川上火

卒得霍亂先腹痛者灸臍上十四壯名太倉在心厭下四寸更度之

先洞下者灸臍邊一寸男左女右十四壯甚者至三四十壯名大腸募洞者宜瀉

先吐者灸心下二寸十四壯又并治下痢不止上氣灸五十壯名巨闕正心厭尖頭下一寸是也

先手足逆冷者灸兩足內踝上一尖骨是也兩足各七壯不愈加數名三陰交在內踝尖上三寸是也

轉筋者灸蹶心當拇指大聚筋上六七壯名涌泉又灸足大指下約中一壯神驗

又方灸大指上爪甲際七壯

轉筋入腹痛者令四人捉手足灸臍左二寸十四灸股中大筋上去陰一寸

若噦者灸手腕第一約理中七壯名心主當中指

下利不止者灸足大指本節內側寸白肉際左右各七壯名大都

乾嘔者灸手腕後三寸兩筋間是左右各七壯名間使若正厥嘔絕灸之便通

小品方起死

吐且下利者灸兩乳連黑外近腹白肉際各七壯亦可至二七

道藏輯要

肘後備急方 美 虛集十

壯

若吐止而利不止者灸臍一夫納中七壯又云臍下一寸二七壯

若煩悶湊滿者灸心厭下三寸七壯名胃管

又方以鹽內臍中上灸二七壯

若達臍痛急者灸臍下三寸三七壯名關元良

治霍亂神祕起死灸法以物橫度病人人中屈之從心鳩尾飛度以下灸先灸中央畢更橫灸左右也又灸背上以物圍令正當心厭又夾脊左右一寸各七壯是腹背各灸三處也華陀治霍亂已死上屋喚魂又以諸治皆至而猶不差者

捧病人腹臥之伸臂對以繩度兩頭肘尖頭依繩下夾背脊  
大骨穴中去脊各一寸炙之百壯不治者可灸肘椎已試數  
百人皆灸畢卽起坐陀以此術傳子孫代代皆祕之

右此前並是灸法

治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

鹽二升以水五升煮取二升頓服得吐愈

又方生薑若乾薑一二升咬咀以水六升煮三沸頓服若不卽  
愈更可作無新藥煮滓亦得

又方飲好苦酒三升小老羸者可飲一二升

又方溫酒一二升以蠟如彈丸一枚置酒中消乃飲無蠟以鹽  
道藏輯要

肘後備急方

老

虛集十

二方寸七代亦得

又方桂屑半升以緩飲二升和之盡服之

又方濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處

又方取楠若樟木大如掌者削之以水三升煮三沸去滓令灼  
之也

又方服乾薑屑三方寸七

又方取蓼若葉細切二升水五升煮三沸頓服之煮乾蘇若生  
蘇汁卽亦佳

又方小蒜一升咬咀以水三升煮取一升頓服之

又方以緩湯漬小蒜五升許取汁服之亦可

又方以人血合丹服如梧子大二丸

又方生薑一斤切以水七升煮取一升分爲三服

又方取賣解家機上垢如雞子大溫酒服之差

又方飲竹瀝少許亦差

又方乾薑二兩甘草二兩附子一兩水三升煮取一升內猪膽  
一合相和分爲三服

又方蘆蓬茸一大把濃煮飲二升差

若轉筋方燒鐵令赤以灼踵白肉際上近後當縱鐵以隨足爲  
留停令成瘡兩足皆爾須臾間熱入腹不復轉筋便愈可脫

刀燒蝦尾用之卽差

道藏輯要

肘後備急方

卷

虛集十

又方煮苦酒三沸以摩之合少粉尤佳以絮胎縛從當膝下至  
足

又方燒梔子二七枚研末服之

又方桂半夏等分末方寸匕水一升和服之差

又方生大豆屑酒和服方寸匕

又方燒蠅蛆膏傅之卽差

若轉筋入腸中如欲轉者

取雞矢白一寸水六合煮三沸頓服之勿令病者知之

又方苦酒煮衣絮絮中令溫從轉筋處裹之

又方燒編薦索三撮仍酒服之卽差

又方釜底黑末酒服之差

若腹中已轉筋者

當倒擔病人頭在下勿使及地腹中平乃止

若兩臂腳及胸脇轉筋

取鹽一升半水一斗煮令熱灼灼爾漬手足在胸脇者湯洗轉筋入腹中倒擔病人令頭在下腹中平乃止若極者手引陰陰縮必死猶在倒擔之可活耳

若注痢不止而轉筋入腹欲死

生薑二兩累擘破以酒升半煮合三四沸頓服之差

治霍亂吐下後心腹煩滿方

道藏輯要

肘後備急方

元

虛集十

梔子十四枚水三升煮取二升內豉七合煮取一升頓服之  
嘔者加橘皮二兩若煩悶加豉一升甘草一兩蜜一升增水  
二升分爲五服

治霍亂煩躁臥不安穩方

葱白二十莖大棗二十枚水三升煮取二升頓服之

治霍亂吐下後大渴多飲則熬人方

以黃米五升水一斗煮之令得三升清澄稍稍飲之莫飲餘物也

崔氏云理中丸方

甘草三兩乾薑人參白朮各一兩搗下篩蜜丸如彈丸覺不

住更服一枚須臾不差仍溫湯一斗以麋肉中服之頻頻三  
五度令差亦可用酒服

四順湯治吐下腹乾嘔手足冷不止

乾薑甘草人參附子各二兩水六升煮取三升半分爲三服  
若下不止加龍骨一兩腹痛甚加當歸二兩胡洽用附子一  
枚桂一兩人霍亂亦不吐痢但四支脈沉肉冷汗出渴者卽  
差

厚朴湯治煩嘔腹脹

厚朴四兩炙桂二兩枳實五枚炙生薑三兩以水六升煮取  
二升分爲三服

道藏輯要

肘後備急方

三

虛集十

凡此湯四種是霍亂諸患皆治之不可不合也霍亂若心痛尤  
甚者此爲挾毒兼用中惡方治之

附方

孫真人治霍亂

以胡椒三四十粒以飲吞之

斗門方治霍亂

用黃杉木劈開作片搗以水濃煎一盞服之

外臺秘要治霍亂煩躁

燒亂髮如鷄子大鹽湯三升和服之不吐再服

又方治霍亂腹痛吐痢

取桃葉三升切以水五升煮取一升三合分溫二服

梅師方治霍亂心痛利無汗

取梨葉枝一大握水三升煎取一升服

又方治霍亂後煩躁臥不安穩

葱白二十莖大棗二十枚以水三升煎取二升分服

兵部手集救人霍亂頗有神效

孫用和治大瀉霍亂不止  
漿水稍酸味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差

附子一枚重七錢炮去皮臍爲末每服四錢水兩盞鹽半錢

煎取一盞溫服立止集效方治吐瀉不止或取轉多四肢發

道藏輯要

附後備急方

卷

虛集十  
川一川

厥虛風不省人事服此四肢漸暖神識便省

回陽散天南星爲末每服三錢入京棗三枚水一盞半同煎至八分溫服未省再服聖惠方治霍亂轉筋垂死

敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁溫溫頓服

又方治肝虛轉筋

用赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合去滓溫分二服

又方治肝風虛轉筋入腹

以鹽半斤水煮少時熱瀆之佳

孫尚書治腳轉筋疼痛攀急者

松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器內慢火  
炒令焦只留三分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜  
酒調下應時筋病皆治之

古今錄驗方治霍亂轉筋

取蓼一手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

治傷寒時氣溫病方第十三

治傷寒及時氣溫病及頭痛壯熱脈大始得一日方

取旨兒根葉合搗三升許和之真丹一兩水一升合煮絞取  
汁頓服之得吐便差若重一升盡服厚覆取汗差

又方小蒜一升搗取汁二合頓服之不過再作便差

道藏輯要

〔肘後備急方〕

卷

虛集十  
川名文

又方烏梅二七枚鹽五合以水三升煮取一升去滓頓服之

又方取生杼木削去黑皮細切裏白一升以水二升五合煎去  
滓一服八合三服差

又方取朮丸子二七枚以水五升接之令熟去滓盡服汁當吐  
下愈

又方雞子一枚著冷水半升攬與和乃復煮三升水極令沸以  
向所和水投湯中急攬令相得適寒溫頓服取汗

又方以真丹塗身令遍面向火坐令汗出差

又方取生蕷荷根葉合搗絞取汁服三四升

又方取乾艾三斤以水一斗煮取一升去滓頓服取汗