

金鈴子一百箇溫湯浸過去皮巴豆二百箇槌微破麩二升同於銅鍋內炒金鈴子赤熟爲度放冷取出去核爲末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其麩巴豆不用也

外臺祕要治膀胱氣急宣下氣

蕪荑搗和食鹽末二物等分以綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣佳

又治陰下濕

吳茱萸一升水三升煮三沸去滓洗瘻差

又治陰頭生瘡

以蜜煎甘草塗之差

道藏輯要

肘後備急方

卷之十一
盧集十二

千金方治丈夫陰頭癰師所不能治

烏賊魚骨末粉傅之良

又千金翼方

鱉甲一枚燒令末以雞子白和傅之良

治目赤痛暗昧刺諸病方第四十三

華陀禁方

令病人自用手兩指擘所患眼垂空咒之曰定定屋舍狹窄不容宿客卽出也

傷寒方末亦有眼方姚方目中冷淚出眞赤痒乳汁煎方

黃連三分蕤仁二分乾薑四分以乳汁一升漬一宿微火煎

取三合去滓取米大傅皆

睛爲所傷損破方

牛淚日二點避風黑睛破亦差

附方

范注方主目中淚出不得開卽刺痛方

以鹽如大豆許內目中翳去鹽以冷水數洗目差

博濟方治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍方或上下臉脣赤爛

浮翳瘀肉侵睛神妙驅風散

五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服一錢水二盞銅石器內煎及一盞澄淨熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能道藏輯要

肘後備急方

主

虛集十二

明眼目去澁痒

簡要濟眾治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛及眼羞明怕日補肝散

夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一錢臘茶調下無時聖惠方治眼痒急赤澀用犬膽汁注目中

又方治風赤眼

以地龍十條炙乾爲末夜臥以冷茶調下一錢七

又方治傷寒熱毒氣攻眼生白翳

用烏賊魚骨二兩不用肉皮杵末入龍腦少許更研令細日三四度取少許點之

又方治久患內障眼

車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如梧桐子大服屢効治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異

取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於砂盆內研令極細眾手撚爲丸如梧桐子每食以焌漿水吞二七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁食豬肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出活之因後數年以病自致死一旦崔爲內障所苦喪明逾年後半夜歎息獨坐時聞階除間悉蟀之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復道藏輯要

〔肘後備急方〕

卷

虛集十一

明因傳此方於世

又方今醫家洗眼湯

以當歸芍藥黃連等分搗細以雪水或泔水煎濃汁乘熱洗冷卽再溫洗甚益眼目但是風毒亦目花翳等皆可用之其說云凡眼目之病皆以血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱卽行故乘熱洗之用者無不神効

又方治雀目不計時月

用蒼朮二兩搗羅爲散每服一錢不計時候以好羊子肝一箇用竹刀子批破移藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲度患人先薰眼藥氣絕卽喫之簡要濟眾治小兒雀目

梅師方治目暗黃昏不見物者

以青羊肝切淡醋食之煮亦佳

又方治眼睛無故突出二三寸者

以新汲水灌漬睛中數易水睛自入

崔元亮海上方著此三名一名西國草一名畢楞伽一名覆盆子治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等取西國草日暴乾搗令極爛薄綿裹之以飲男乳汁中浸如人行八九里久用點目中卽仰臥不過三四日視物如少年禁酒油麪

千金方點小兒黑花眼醫澀痛

道藏輯要

肘後備急方

卷

虛集十一
四十六

用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點之妙

又方常服明目洞視

胡麻一石蒸之三十遍末酒服每日一升

又方古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後吞一枚

十日身輕三十日白髮黑百日內通神

孫真人食忌主眼有翳

取芒消一大兩置銅器中急火上煆之放冷後以生絹細羅點眼角中每夜欲臥時一度點妙

經驗方退翳明目白龍散

馬牙消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百

二十日取出研如粉入少龍腦同研細不計年歲深遠眼內生翳膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並醫得每點用藥末兩米許點目中

又方治內外障眼

蒼朮四兩米泔浸七日逐日換水後刮去黑皮細切八青鹽一兩同炒黃色爲度去鹽不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同搗爲末每日不計時候但飲食蔬菜內調下一錢七服甚驗

經驗後方治虛勞眼睛

採三月蔓菁花陰乾爲末以井花水每空心調下二錢七久道藏輯要

肘後備急方

罕

虛集十二

服長生可讀夜書

外臺祕要主目翳及努肉

用礬石最白者內一黍米大於翳上及努肉上卽冷淚出編拭之令惡汁盡其疾日日減翳自消薄便差礬石須真白好者方可使用

又補肝散治三十年失明

蒺藜子七月七日收陰乾搗散食後水服方寸七

又療盲

豬膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頓良

又方治翳如重者

取猪膽白皮曝乾合作小繩子如龜釵股大小燒作灰待冷
便以灰點翳上不過三五度即差

又方輕身益氣明目

蕪菁子一升水九升煮令汁盡日乾如此三度搗末水服方
寸七日三

斗門方治火眼

用艾燒令烟起以碗蓋之候烟上碗成煤取下用溫水調化
洗火眼即差更入黃連甚妙

廣利方治眼築損努肉出

生杏仁七枚去皮細嚼吐於掌中及熱以綿裹筋頭將點努

道藏輯要

肘後備急方

里

盧集十二

肉上不過四五度差

藥性論云

空心用鹽揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良

顧含養嫂失明

含嘗藥視膳不冠不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡求不得
有一童子以一合授含含開乃蚺蛇膽也童子出門化爲青
鳥而去嫂目遂差

治卒耳聾謹病方第四十七

葛氏耳卒聾

取鼠膽內耳內不過三愈有人云側臥添一膽盡須臾膽汗