

甘草入腹卽定方稱大豆解百藥毒嘗試之不效乃加甘草爲甘豆湯其效甚速

梅師方蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐藥煎濃豉汁服之

聖惠方治硫黃忽發氣悶用羊血服一合效

又方治射罔在諸肉中有毒及漏脯毒

用貝子末水調半錢服效或食麪臘毒亦同用

初虞世方治藥毒祕效

巴豆去皮不出油馬牙硝等分合研成膏冷水化一彈子許

道藏輯要

附後備急方

奎

虛集上

服差

治食中諸毒方第六十九

蜀椒閉口者有毒戟人咽氣便欲絕又令人吐白沫

多飲桂汁若冷水一二升及多食大蒜卽便愈慎不可飲熱

殺人比見在中椒毒合蒜及薺芫差

鉤吻葉與芥相似誤食之殺人方

薺芫八兩水六升煮取三升服五合口五服又云此非鉤吻

食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死方

取雞屎燒末服方寸七不解更服又煮葛根飲汁

良苦毒煮甘草汁擣藍汁飲並良

苦瓠毒煮黍穰令濃飲汁數升佳

食馬肝中毒

取牡鼠屎二七枚兩頭尖者是水和飲之未解者更作

食六畜鳥獸

幞頭垢一錢七小品云起死人父飲豉汁數升良

凡物肝臟自不可輕噉自死者彌勿食之生食肝中毒

擣附子末服一刀圭日三服

肉有箭毒以藍汁大豆解射荅毒

食鬱肉謂在密器中經宿者及漏脯茅屋汁霑脯爲漏脯此前並有毒

道藏輯要

肘後備急方

卷

盧集

燒人屎末酒服方寸七

又方擣薤汁服二三升各連取以少水和之

食黍米中藏脯中毒方

此是鬱脯煮大豆一沸飲汁數升卽解兼解諸肉漏毒

食自死六畜諸肉中毒方

黃蘖末服方寸七未解者數服

六畜自死皆是遭疫有毒食之洞下亦致堅積並宜以痢丸下之

食魚中毒

濃羹橘皮飲汁小品云冬瓜汁最驗

食豬肉遇冷不消必成蟲癥下之方

大黃朴硝各一兩巴硝亦佳煮取一升盡服之若不消並及研杏子湯三升和三服吐出神驗

食牛肉中毒煮甘草飲汁一二升

食馬肉洞下欲死者

豉二百粒杏子二十枚咬咀蒸之五升飯下熟合搗之再朝服令盡

此牛馬皆謂病死者耳

食鱸魚肝及鰐鯪魚中毒

剉蘆根煮汁飲一二升良

道藏輯要

肘後備急方

蓋

虛集十二

解毒濃黃香蘇飲汁一升

飲食不知是何毒

依前甘草薺荅通療此毒皆可以救之

食菹菜誤吞水蛭蛭噉臟血腸痛漸黃瘦者

飲牛羊熱血一二升許經一宿便煖猪脂一升飲之便下蛭

食菌遇毒死方

絞人屎汁飲一升卽活服諸吐痢丸亦佳又掘地作土漿服二三升則良

誤食野芋欲死療同菌法

凡種芋三年不取亦成野芋卽殺人也

附方

梅師方治飲食中毒魚肉菜等

苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服之吐出卽愈或取
煮犀角汁一升亦佳

又方治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發熱妄語煮蘆根飲
之

又方杏仁一升去皮水三升煎沸去滓取汁爲三服下肉爲度
金匱方治食蟹中毒

紫蘇煮汁飲之三升以子汁飲之亦治凡蟹未經霜多毒
又聖惠方以生藕汁或煮乾蒜汁或冬瓜汁並佳

道藏輯要

肘後備急方

卷

虛集十一

又方治雉肉作臚食之吐下

用生犀角末方寸七新汲水調下卽差

唐崔魏公云鉉夜暴亡有梁新聞之乃診之曰食毒僕曰常好
食竹雞竹雞多食半夏苗必是半夏毒命生薑擂汁折齒而

灌之活

金匱方春秋二時龍帶精入芹菜中人遇食之爲病發時手青
肚滿痛不可忍作蛟龍病服硬糖三二升日二度吐出如蚯
蚓三二個便差

明皇雜錄云有黃門奉使交廣回周顧謂曰此人腹中有蛟龍
上驚問黃門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱因且

渴遂飲水覺腹中堅痞如杯周遂以硝石及雄黃煮服之立
吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺
復以苦酒沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上甚訝之

治防避飲食諸毒方第七十

雜鳥獸他物諸忌法

白羊不可雜雄雞 羊肝不可合烏梅及椒食 猪肉不可
雜羊肝 牛腸不可合犬肉 雄雞肉不可合生菜 蟹
鴨肉不可合蒜及李子鱉肉等 生肝投地塵芥不著者不
可食 暴脯不肯燥及火炙不動并見水而動並勿食 鳥
獸自死口不開者不可食

道藏輯要

肘後備急方

卷

盧集士

水中魚物諸忌

魚頭有正白連諸脊上不可食 魚無腸膽及頭無鯈勿食
魚不含烏雞肉食 生魚目亦不可作膾 魚勿合小豆
藿 青魚鮓不可合生胡荽 鱉目凹者不可食 鱉肉不
可合雞鴨子及赤莧菜食之 姜、薑者不可食鱠魚

雜果菜諸忌

李子不可合雞子及臨水食之 五月五日不可食生菜
病人不可食生胡芥菜 姜、薑勿食桑椹並鴨子巴豆藿
羹半夏菖蒲羊肉細辛桔梗忌菜 甘草忌菘菜 牡丹忌
胡荽 常山忌葱 黃連桔梗忌豬肉 茄子忌大醋 天