

石鍾乳 土瓜根 大棗

蜻蜓

右七味等分治下篩食畢用酒服方寸七

日三

又方母猪蹄一具粗切以水二斗熟煮得五

六升汁飲之不出更作

又方

猪蹄二枚熟
火燒碎通草細切

右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出

更作外臺猪蹄不炙以水一斗煮之
取四升入酒四升更煮飲之

又方桔梗根切一升酒四升煮三沸去滓分三服

又方

桔梗根各三兩

漏蘆各三兩

石鍾乳各四兩

白頭翁一兩

滑石

通草各二兩

右六味治下篩以酒服方寸七日三

又方取桔梗子尚青色大者一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫服一升日三黃色小者用二枚亦好

又方土瓜根治下篩服半錢七日三乃乳如

流水

單行鬼箭湯治同前

鬼箭五兩以水六升煮取四升每服八合

日三亦可燒作灰水服方寸七日三

甘草散治同前

甘草一兩

苦杏仁

通草三十克

石鍾乳二十克

雲母二兩

屋上散草二把燒爲灰

右五味治下篩食後溫漏蘆湯服方寸七

日三乳下止

又方燒死鼠作屑酒服方寸七日三立下勿

○令知

又方燒鯉魚頭爲末酒服三指搘

鯉魚湯下乳汁方

鯉魚長七寸

豬肪斤半

漏蘆

石鍾乳各八兩

右四味切猪肪魚不須洗治清酒一斗二

升合煮魚熟藥成絞去滓適寒溫分五服其間相去須臾一飲今藥力相及爲佳乳此一方大須精熟不得同於常方耳特忌上即下

孫真人備急千金要方卷之三

孫真人備急千金要方卷之四

卷六

宋朝太常少卿充秘閣校理林億等校正

婦人方

虛損第一論方並汗附

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須

將慎危篤之至其在於斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病廣

於嵩岱何則產後之病難治於餘病也婦人

產訖五臟虛羸惟得將補不可轉漏若其有

病不須缺藥若行缺藥轉更增虛就中更虛

向生路遠所以婦人產後百日以來極須懶

懶憂畏勿縱心犯觸及即便行房若有所犯

必身反強直猶如角弓反張名曰蓐風則是

其犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜

好思之苟或在微不慎戲笑作病一朝因財

控告無所縱多出財寶遍處求醫者未必

解此縱得醫來大命已去何處追尋學者於

此一方大須精熟不得同於常方耳特忌上

廁便利宣室中盆上佳

凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百

去肉內餘藥煮取三升去滓分三服不瘥
 重作十全大補丸有慈白一斤子母松綠若胃中微熱加黃芩參門冬各一兩
加大黃膏一兩中風加防風一兩大便不利者一兩小便難加葵子一兩上氣飲
 猪腎湯治產後虛羸喘乏乍寒乍熱病如瘧
 狀名蓐勞方遠加五味蜜水一兩
 猪腎一具去脂四破若無用羊脂代歸各二兩為六味
 白粳米 葱白各一兩
 香豉半升
 右四味以水三斗煮取五升去滓任情服
 羊肉黃耆湯治產後虛乏補益方廣濟方有人參當歸各二兩為六味
 之不瘥更作當歸各二兩為六味
 荷苓 桂心 大棗三十枚
 羊肉三斤 黃耆三兩 大棗三十枚
 荷苓 甘草 當歸
 桂心 麥門冬 乾地黃
 右十味㕮咀以水二斗煮取五升去滓分三服日三
 肉內諸藥煎取三升去滓分三服日三
 鹿肉湯治產後虛羸勞損補之方
 鹿肉四斤 乾地黃 甘草
 荷苓 黃耆 荷藥

麥門冬 荷苓各三兩 人參
 當歸 生薑各二兩 半夏一升
 大棗二十枚
 右十三味㕮咀以水二斗五升煮肉取一斗三升去肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一
 膜骨湯治產後虛乏五勞七傷虛損不足臟腑冷熱不調方洪百堅 製作
 膜骨一具 遠志
 荷藥 乾薑
 荷苓一作威神 厚朴各三兩 當歸
 橘皮 甘草
 荷苓各二兩 桂心
 荷藥一升 生薑各四兩 麥門冬二升
 右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服
 治婦人產後上氣貢肺氣積勞臟氣不足胸中煩躁關虛煩第二方
 薏白 半夏 甘草
 人參 知母各二兩 石膏四兩
 當歸一兩 荷藥三兩 麥門冬半升
 右十五味㕮咀以水三斗煮膜骨取二升去骨內藥煎取五升去滓分五服

當歸荷藥湯治產後虛損逆害飲食方天師清言
 當歸 荷藥各二兩 人參
 桂心 生薑
 大棗二十枚 乾地黃
 右八味㕮咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二熟甚即加石膏知母各一兩
 竹根湯治產後虛煩方
 甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓內小麥二升大棗二十枚復

煮麥熟三四沸內甘草一兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短氣亦服之

人參當歸湯治產後煩悶不安方

人參

當歸

麥門冬

乾地黃

桂心各一兩

大棗二十枚

梗米升

芍藥四兩

淡竹葉三升

右九味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升去滓內藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當取豉一升以水三斗

煮取一升盡服之甚良

甘竹茹湯治產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹升

人參

茯苓

甘草各一兩

黃芩三兩

生薑

知母三兩

甘草各一兩

黃芩二兩

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分

閨方

知母三兩
桂心
甘草各一兩
黃芩二兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服一方不用桂心加生地黃

自体方服一劑不瘥更作若氣逆者加半夏二兩

赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服

竹葉湯治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉

麥門冬各一升

甘草二兩

生薑

茯苓各三兩

大棗十四枚

之良

蒲黃散治產後煩悶方

蒲黃以束流水和方寸匕服極良

蜀漆湯治產後虛熱往來心胃煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡時輒甚又如微瘧方

蜀漆葉

桂心

甘草

○黃芩各一兩

黃耆五兩

知母

○芍藥各二兩

生地黃一斤

○

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服治寒熱不傷人

芍藥湯治產後虛熱頭痛方

白芍藥

乾地黃

牡蠣各五兩

桂心三兩

右六味㕮咀以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃內諸藥煮取二升去滓分二服羸人分作三服若有人參入一兩若無人參內茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良無

煩悶若通身發熱加黃芩二兩

中風第三論方

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉

竊吐利必死無疑大豆紫湯產後大善
大豆紫湯治產後百病及中風痱痙或背強

口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癱劇者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為

驗方

大豆五升

清酒半斗

○

右二味以鐵鑄猛火熬令極熱焦煙出
以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更

合小汗則愈一以去風二則消血結如妊娠傷折胎死在腹中三日服此酒即瘥

獨活紫湯治產後百日中風痙口噤不開并

○

治氣痛勞傷補腎方

獨活一斤

大豆五升

舊酒一斗

○

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微大

劑之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙

出以獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活八兩 葛根 生薑各六

甘草兩

○

甘草四兩

葛根

生薑各六

右四味㕮咀以水九升煮取三升去滓分四服微汗佳

○

甘草湯治在蓐中風背強不得轉動名曰風

瘦方

○

甘草

乾地黃

麥門冬

○

葛根

麻黃各二兩

○

葛根

鹿肉湯治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方

鹿肉三斤

芍藥

獨活

秦艽

半夏升一

黃芩

黃耆各三兩

芎藭各二兩

乾地黃

桂心

甘草兩

生薑六兩

甘草

石膏

紫石英三兩

赤石脂

柴胡半斤

黃芩

人參

人參

黃芩

白术

甘草各三兩

生薑二兩

大棗十二枚

桂心

桔梗根

芎藭

半夏半升

通草

甘草

桂心

獨活三兩

葛根

當歸

生薑

大棗

桂心

防己

白术

甘草各三兩

生薑

大棗

桂心

桔梗根

芎藭

半夏半升

通草

甘草

桂心

獨活

葛根

當歸

生薑

大棗

桂心

桔梗根

芎藭

半夏半升

通草

甘草

桂心

桔梗根

芎藭

半夏半升

通草

甘草

桂心

桔梗根

芎藭

半夏半升

通草

甘草

桂心

桔梗根

芎藭

半夏半升

通草

夜二

○

五石湯治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫
癰癧眩冒不知人及濕痺緩弱身體痙攣姪姪

百病方

鍾乳

赤石脂

芩湯頭痛與小柴胡湯方

小柴胡湯治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱

皆自發露所為若頭不痛但煩熱與三物黃

芩湯頭痛與小柴胡湯方

半去滓分五服

小柴胡湯治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱

皆自發露所為若頭不痛但煩熱與三物黃

芩湯頭痛與小柴胡湯方

柴胡半斤

黃芩

人參

甘草各三兩

生薑二兩

大棗

半夏半升

通草

甘草

通草

甘草

大棗

羊內湯治產後中風久絕不產月水不利乍赤乍白及男子虛勞冷感方

羊肉二斤 香豉升各三

成擇大蒜去皮切

右三味以水一斗三升煮取五升去滓內

酥一升更煮取三升分溫三服

葛根湯治產後中風口噤痙攣氣息迫急眩冒困頓并產後諸疾方

葛根兩 當歸三兩 甘草六兩 桂心四兩

茯苓半升

人參一兩

石膏八兩

○

白朮一兩

芎菊兩

防風兩各二

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三

防風酒治產後中風方

防風一兩 獨活各一兩 女萎半兩

○

右六味㕮咀以酒二斗漬三宿初服一合
稍加至三四合日三
木防己膏治產後中風方

木防己半兩 茵芋五兩

右二味㕮咀以苦酒九升漬一宿楮膏四升煎三上三下膏成丸子摩手遍擦

治產後中風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方

獨活八兩 當歸四兩

○

右二味㕮咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一取微汗葛氏單用獨活小者加桂心二兩不處更作

○

浴湯治產後中風流腫方

鹽五升 雞毛一把燒

○

右二味以水一石煮鹽作湯內雞毛灰著湯中適冷暖以浴大良又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破者以紫湯一服瘥神效紫湯是妙黑豆作者效方

○

治產後中風頭面手臂通滿方

大豆三升以水六升煮取一升半去豆澄清更煎取一升內白朮八兩附子三兩獨活三兩生薑八兩添水一斗煎取五升內籽酒五升合煎取五升去滓分

○

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三羸者分四服產後得此正是心虛所致無當歸用芎菊若其人心腎逆氣加半夏三兩

茯苓湯治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍惚心中憤憤此皆心虛所致方

五服日三夜一間粥頻服三劑

茯神湯治產後忽苦心中衝悸或恚意不定恍惚言語錯謬心虛所致方

茯神四兩 人參一兩 茯苓各三兩

○

桂心各二兩 生薑八兩 大棗三十枚

○

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三夜一良

○

速志湯治產後忽苦心悸衝悸不定恚意不安言語錯誤恍惚憤憤情不自覺方

○

遠志一兩 甘草一兩 當歸一兩 桂心各二兩

○

麥門冬二兩 人參一兩

○

芍藥一兩 茯苓五兩 生薑大半升

○

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分

三服日三羸者分四服產後得此正是心虛所致無當歸用芎菊若其人心腎逆氣加半夏三兩

○

三升一服五合漸加至六合禁勿冷食

大巖蜜湯治產後心痛方

乾地黃 當歸 獨活
甘草 芍藥 桂心
細辛 小草各二 吳茱萸一
乾薑三

右十味㕮咀以水九升煮取三升內蜜五
合重煮分三服日三胡洽不用獨活桂心
小草千金翼不用蜜

乾地黃湯治產後兩脅滿痛兼除百病方

乾地黃 芍藥各三 當歸

蒲黃各二 生薑五
甘草兩 大棗二十

○
右八味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓
分服日三

芍藥湯治產後苦腹少痛方

芍藥六

兩

桂心 生薑各三

十九

膠鈎令烊分三服日三

當歸湯治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中

○
右六味㕮咀以水七升煮取四升去滓肉
膠鈎令烊分三服日三

乾薑無

絞痛方

當歸

芍藥各二兩子母

羊內湯

羊肉一斤

羊肉三斤

當歸

黃芩財用

黃芩財用

防風

附後用

甘草各二

兩

藥得三升適寒溫服七合日三胡洽不用
金匱要略

羊內湯

羊肉一斤

芍藥三

生薑四

甘草各二

兩

羊內湯

黃芩財用

防風

附後用

羊肉三斤

生地黃炒二桂心
甘草

當歸

芍藥三兩

芎藶

右八味咬咀以水二斗煮肉取一斗去肉
內藥煎取三升分四服日三夜一

內補當歸建中湯治產後虛羸不足腹中病
痛不止吸吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背
不能飲食產後一月日得服四五劑為善令
人力壯方

當歸四兩

芍藥五兩

甘草二兩

生薑六兩桂心三兩大棗十八枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升去滓分
三服一日今盡若大虛內飴糖六兩作湯
成內之於火上飴消若無生薑則以乾薑
三兩代之若其人去血過多崩傷內竭不
止加地黃六兩阿膠二兩合八種作湯或
去滓內阿膠若無當歸以芎藶代之

內補芎藶湯治婦人產後虛羸及崩傷過多
虛竭腹中絞痛方

芎藶

乾地黃各四兩

芍藥五兩

桂心二兩
大棗四十枚

甘草
乾薑各二兩

生牛膝酒治產後腹中苦痛方

生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分
二服若用乾牛膝根以酒漬之一宿然

後可發

右七味咬咀以水一斗二升煮取三升去
滓分三服日三不瘥復作至三劑若有寒
苦微下加附子三兩治婦人虛羸少氣傷

絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及唾
吐血甚良

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急

或弱血少腹苦痛或從高墮下犯內及金瘡

血多內傷男子亦宜服之方

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒

溫頓服

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒

溫頓服

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒

溫頓服

吳茱萸湯治婦人先有寒冷胃滿痛或心腹
刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息綿
惙欲絕產後益劇皆主之方

吳茱萸二兩防風桔梗

乾薑

甘草

細辛

當歸各二十枚
乾地黃十八枚

右八味咬咀以水四升煮取一升半去滓

分再服

右十二味咬咀以酒一斗漬藥一宿明日

以水一斗合煮取五升去滓分五服日三
夜二有黃者入二兩益佳

蒲黃治產後餘疾胸中少氣腹痛頭疼餘

血未盡除腹中脹滿欲死方

蒲黃生地黃生薑各五兩

桂心各一兩

桃仁二十枚
大棗十五枚

硝石二兩

桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分
三服日三

右八味咬咀以水九升煮取二升半去滓

內芒消分三服日三良驗

敗醫湯治產後疼痛引腰腹中如錐刀所刺

之方

敗醫兩

桂心

芎菊兩半

當歸兩

桂心

芍藥兩半

右四味咬咀以清酒二升水四升微火煮
取二升去滓適寒溫服七合日三食前服

之敗醫一兩用

芎菊湯治產後腹痛方

芎菊

甘草各二

蒲黃

芍藥七味

女萎各一兩半

桂心

大黃各三

桃仁七味

當歸兩十八

桂心

大黃十株

黃耆千金翼前胡各一兩半

桂心

桃仁十株

右十二味咬咀以酒水各五升合煮取三

升去滓先食服一升日三

千金翼無人參

當歸芎菊比黃

治婦人心痛方

治產後腹脹痛不可忍者方

棗黍粘根為飲一服即愈

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活

桂心

生薑各三

甘草兩

芍藥

桂心

生薑各三

大棗二十

孫真人備急千金要方卷之四

孫真人備急千金要方卷之五

校七

宋朝某郎中太常少卿光祖醫林堂等校正

婦人方

惡露第五方

芍藥黃耆湯治產後心腹痛方

白芷

人參

桂心

乾地黃

芍藥

桂心

黃耆

當歸

桂心

細辛

芍藥