

桂心	獨活	天門冬
秦艽	烏頭	各一
乾薑	當歸	兩
杜仲十錢	桔梗	防風
各三	細辛	山茱萸
		莽草
前胡	五味子各一 八味子半錢	麻黃
白芷	白术各半錢	
秦艽	乾薑	
附子各一 兩	桔梗	
天門冬	白术	
人參		

右十九味治下篩酒服方寸匕日三若老
人少服之胡洽無天門參前胡有草桂
心防已草薢白芍黃耆爲二十味

單服松脂治一切風及大風脚弱風癆方薰
陸法亦同

○ 松脂三十斤以棲皮袋盛繫頭鑑底布
竹木置袋於上以石三五顆壓之下水。
於鑑中令滿煮之膏浮出得盡以後量
更二十沸接置於冷水中易袋洗鍋更
煮如此九遍藥成搗篩爲散以麪糰下
之用酒服一方寸匕日二初和藥以冷
酒藥入腹後飲熱酒行藥以知爲度如
覺熱即減不減今人大小便祕澀若澀
宜食葱姜薑仍自不通宜服生地黃汁微
取泄利除忌大麻子以外無所禁若欲
斷米加茯苓與松脂等分蜜和爲圓但

淮南人公石斛萬病散	治風濕痺腰脚不隨
一斤松脂	<small>切去</small> 茯苓與棗栗許大酥即不澀
服經一百日後	脚氣當愈仙經曰服松脂一年增壽一年服二年及
服之十年	則增壽十年
防風	杏芩
細辛	蜀椒
雲母	乾薑
乾地黃	附子
杜仲	人參
天雄	石斛
牛膝	遠志
薯蕷	草薢
續斷	蛇牀子
巴戟	桂心
山茱萸各一	菟絲子
味子半兩	白朮

右二十七味治下篩酒服方寸七日再

茱萸散治冷風脚跛偏枯半身不隨晝夜呻吟醫所不治

吳茱萸 乾薑

牡荆千金翼作桂附子

白斂 天雄

狗脊 乾漆

薯蕷

秦艽 防風各半

烏麻酒方

右十一味治下篩先食服方寸七日三藥入肌膚中淫淫然三日知一月瘥

酒醴第四方

○例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥內酒中密封頭春夏四五日秋冬七八日皆以味足爲度去滓服酒盡後其滓擣酒服方寸七日三大法冬宜服酒至立春宜停

石斛酒治風虛氣滿脚疼痺弱不能行方石斛 丹參 五加皮各五兩

○鍾乳八兩 杜仲 防風 當歸各三兩 薏苡仁各一兩 天門冬各五兩 牛膝

附子 黃耆 蒼朮

當歸各四兩 乾薑各三兩 山茱萸

○右十六味㕮咀以清酒三斗漬之三日初服三合日再後稍加之以知爲度

枸杞首蒲酒治緩急風四肢不隨行步不正口急及四體不得屈伸方

○石斛 丹參 五加皮各五兩 側子 秦艽 牛膝各四兩 桂心 乾薑 羌活 蒼朮 橘皮 黃耆 白前

蜀椒 茵芋 當歸各三兩

薏苡仁一升 防風二兩 鍾乳八兩 醉別編

菖蒲五錢 枸杞根一斤 伯

右二味細剗以水四石煮取一石六斗去滓濃熬大 津釀二斛米酒熟稍稍飲之

虎骨酒治骨髓疼痛風經五臟方

虎骨一具炭火多令黃色搗刮取碎搗

研得數日清酒六升浸五宿隨性多少

稍飲之易云虎嘯風生龍吟雲起此亦

有情與無情相感治風之效故亦無疑

茱萸酒治胃管冷不能飲食耳目不聰明四肢

有氣冬卧脚冷服此酒十日後目既精明體

又充壯方

○八月三日取蓼曝燥杷之如五升大六

十把水六石煮取一石去滓以釀酒如常法隨多少飲之已用訖效甚速

小黃耆酒大治風虛痰癥四肢偏枯兩脚弱

手不能上頭或小腹縮痛脇下痙急心下有

伏水脇下有積飲夜喜夢悲愁不樂恍惚善忘此由風虛五臟受邪所致或久坐腰痛耳

掣卒起眼眩頭重或舉體流腫疼痺飲食惡冷濘瀉惡寒曾中痰滿心下寒疝藥皆主之

遠志

牡荆子

芎藭

地骨皮

五加皮

杜仲

厚朴

枳實

白朮

牛膝

丹參

獨活

茵芋

石南

狗脊

礞石

薏苡仁

麥門冬

生石斛

生地黃

升

右三十九味

㕮咀以酒八斗漬七日溫服

一日四五夜一石藥細研別絹袋盛共

藥同漬藥力和善主治極多

凡是風虛四

體小覺有風病者

皆須將服之無所不治

也服者一依方修合不得輒信人大言浪

有加減

鍾乳酒治虛損通順血脉極補下氣方

鍾乳

方

生白朮淨洗一石五斗

燒取汁三

煎取半

濕荆二十五束

束別三尺

圍各長二尺

五寸徑頭二寸

燒取徑三

斗煎取半

青竹三十束

束別三尺

圍各長二尺五

寸徑一寸

燒取徑三

斗煎取半

生地黃根五大斗

燒取半

大者搏取汁三

斗煎取半

生五加根

三十

六斤淨洗訖

封於大釜

取汁七斗

以銅器中盛

大釜內

水上煎

諸藥生

一準五

加水

取汁三斗

五升其煎

諸藥生

一準五

加水

過兩劑方

松葉六十斤㕮咀以水四石煮取四斗
九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁
以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲
之取醉得此力者甚衆神妙

切五

十二

治脚氣方

好豉三斗蒸一石米下曝乾如是三上
以酒五斗漬七日去滓飲惟醉爲佳酒

盡更以二斗半漬之飲之如初

側子酒治風濕痺不仁腳弱不能行方

側子 牛膝 丹參

山茱萸 蒴藴根

石斛各四兩 防風

蜀椒 蜀椒

秦艽 桂心

當歸 白术

白术 菊芋各三兩

當歸 蒼朮

五加皮五兩 紫蘇仁一升

右二十味㕮咀盛清酒四斗漬六宿

初服三合稍加以知爲度患目昏頭眩者

彌精

膏第五方

例曰凡作膏常以破除日無令喪孝汚穢產
婦下賤人雞犬禽獸見之病在外火灸摩之
在內溫酒服如棗核許
神明白膏治百病中風惡氣及頭面諸病膏

切五

十三

盲風目爛皆管腎耳聾鼻塞齶齒齒根挺痛
及癰痔瘡癰疥等方

吳茱萸

蜀椒

芎藶

白术

前胡

芎藶

附子

桂心

當歸

細辛

附子

桂心

細辛

桂心

當歸

細辛

附子

桂心

細辛

桂心

或緩或急或心腹久寒積聚疼痛敷逆上氣
往來寒熱鼠漏瘧癥歷節肢腫關節盡痛男
子七傷膚脹腹滿羸瘦不能飲食婦人生產
餘疾諸病癟疥惡瘡癰瘍體陰蝕黃疸發背馬
鞍牛領瘡腫方

當歸 桔梗根 乾地黃

甘草 蜀椒各六兩 半夏七合

桂心 黃芩 細辛

附子各四兩 桔梗

天雄 黃芩 皇芩各半兩

厚朴 乾薑 人參

寄生 纖斷 生竹茹六升

黃野葛二分 巴豆二十枚

石南 苦酒一升 猪脂三升

杏仁各一升 茅草

苦酒六升 茅鹽各三升

黃野葛二分 巴豆二十枚

杏仁各一升 猪脂三升

苦酒一升 茅鹽各三升

黃野葛二分 巴豆二十枚

杏仁各一升 猪脂

孫真人備急千金要方卷之二十五 切大

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林衡等校正

荅梧道士陳元首治一切風濕骨肉疼痛方

蛇附防
風通甲

當歸

桂心

五寸

天雄

三十步

細辛

各一

芎芻

各一

生地黃

斤

黃色絞去滓研雄黃丹砂如粉內之攪至

凝乃止膏成盛不津器中諸蜈蚣蛇蜂等

毒者以膏置瘡上病在外悉停之摩之以

右十二味㕮咀以地黃汁漬藥一宿煎猪

肪去滓內藥煎十五沸去滓內丹砂末熟

攪用火炙手摩病上日千偏瘻

胡洽

有人

後半金銀有附子二十二粒雄黃二兩半

大酢三升爲十五味

水

○

孫真人備急千金要方卷之二十四

○

論雜風狀第一

○

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺

三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初

得輕微人所不悟宜速與續命湯依輸穴灸

之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最

重也

○

偏枯者半身不隨肌肉偏不用而痛言不變

○

智不亂病在分脰之間溫卧取汗益其不足

○

損其有餘乃可復也

甲乙經云溫卧

取汗則巨取之

○

風痺者身無痛四肢不收智亂不甚言微

知則可治甚即不能言不可治

○

風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然

黑一赤吐沫

○

有舌溫不能言病在臟腑先入陰後入陽治

之先補於陰後寫於陽發其汗身轉輾者生

汗不出身直者七日死

中左右白者可治一

○

風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺肥

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○