

丸散亦然凡此風之發也必由熱盛故有竹瀝葛汁等諸冷藥馬後之學者不能仔細識其方意故有茲論具而述之其人無密室者不可與療以彊人居室不密尚中風邪況服藥之人乎

治風癥不能語手足不遂方

度病者手小指內岐間至指端為度以置牕上直望心下以丹注度上端畢又作兩度續所注上合其下開其上取其本度橫置其間令三合其狀如到作ム字形男度左手女度右手嫌不分了。壯愈

孫真人備急千金要方卷之二十七

初八

十

治中風口噤不能言方

論曰脾脉絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

○日三
故上丹注三處同時起大灸之各一百

○日三
○治中風口噤不知人者方
○右二味煮取一升薄頭以布裹之日一度升分三服大汗勿怪

又方

初九

二

一

○芥子半
○醋三
○甘草四
○麻黃各二
○防風四
○葛根三
○芍藥各一
○生薑四
○治中風口噤不能言方
○右二味煮取七升煮取三升漸飲之以治

○右八味咬咀以水六升煮取二升半分三服瘡癰不語皆治之

孫真人備急千金要方卷之二十八 初九

宋朝太常少卿文忠閣校理林傳等整理

治諸風方

風懿第六論

針灸法

獨活湯治風懿不能言四肢不收手足顫曳

○石南 乾薑 各一 桂心

獨活四
桔梗根
生葛各二
甘草三
生薑六

○石南 乾薑 各一 桂心
細辛 人參各一
當歸 茯苓各一
甘草二
○乾坤黃十八食茱萸三十
○右十二味咬咀以水六升酒三分煮取三升分三服大汗勿怪

○芥子半
○醋三
○吳茱萸升
○防己五
○吳茱萸升
○桂心一
○麻黃各二
○甘草四
○防風四
○葛根三
○芍藥各一
○生薑四
○治中風口噤不能言方
○右二味煮取一升薄頭以布裹之日一度升分三服大汗勿怪

○又方白朮四兩以酒三升煮取一升頻服
○又方服荆瀝一升

又方服淡竹瀝一升

針灸法

卒中風口噤不得開灸機關千金翼二穴
在耳下八分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者遂僻左右灸之中風失瘡不能言

桂湯治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗亦可末桂著舌下漸漸嚥計

治卒不得語方

又方濃煮大豆汁含亦佳無豆用豉

酒五合和人乳汁中半分爲二服

論曰夫眼瞤動口脣偏渴皆風入脉急與人多百會則風氣不得淺內攻五臟喜閉伏仍失音也所以先灸天窓大百會佳一灸五十壯悉復火勢復灸之視病輕重重者一處三

○百壯大效凡中風服藥益劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神良決定勿疑惑也不至心者勿浪盡灸

論曰風寒之氣客於中滯而不能發故瘡不能言及喉痺失聲皆風邪所爲也入臟皆能殺人故附之於治風方之末凡尸厥而死脉動如故此陽脉下墮陰脉上爭氣閉故也針百會入三分補之灸熨斗熨兩脇下又竈突墨彈九大漿水和服之又針足中趾頭去甲如韭葉又刺足大趾甲下內側去甲三分

麻黃

人參各二

獨活

附子

防已各三

當歸

側子各二

生薑

石膏

茯神各四

芍藥

白朮

黃芩

細辛各一

秦艽

四

防風

菊花升

淡竹瀝升

右二十一味㕮咀以水一斗先煮麻黃去沫取七升內竹瀝及藥煮取三升分四服

服三服訖間一盃粥後更進一服待藥勢

自汗慎生冷醋蒜麩乳酪魚等

○治中風面目相引口偏著耳牙車急舌不得轉方

獨活雨三
生地黃汁
竹瀝各一
右三味合煎取一升頓服之即愈

又方

牡蠣
礬石
附子

竈下黃土

右四味各等分爲末取三年雄雞冠血和藥傅其上持鏡候纔欲復故便急洗去之不速去便過不復還也塗左偏左塗右

附子散治中風手臂不仁口面渴僻方
附子
桂心各五
細辛
乾薑各六

防風

人參

正一

雞冠血及鼈血塗乾復塗之并灸吻邊橫文
赤白際逐左右隨年壯報之至三報三日不
瘥更報之

甘草

桂心

芎菊

又方

竹瀝升

防風

防已

升麻

桂心

芎藭各二兩

麻黃四兩

羚羊角三兩

右八味咬咀以水四升合竹瀝煮取一升

半分三服日服一劑常用效

又方青松葉一斤搗令汁出清酒一斗漬二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面

汗出即止

又方酒煮桂取汁以故布搗病上正則止左

○渴搗右右渴搗左此秘方不傳余常用

大效

治口耳僻方

防風

附子

葛根各二兩

柏實

麻黃各三兩

獨活

生薑各四兩

杏仁三十枚

角弓反張第七方

○右八味咬咀以水一斗酒二升煮取三升

分四服

治卒中風口渴不正方

取空青末如豆大一枚含之即愈

又方炒大豆三升合焦以酒三升淋取汁頓服時後以治口噤不開

人參 桂心 當歸

黃芩 乾薑

甘草八十克

八鉢石膏一兩

杏仁四十克

當歸

防風

獨活

細辛半兩

麻黃三十克

當歸

右九味咬咀以井花水九升煮取三分

三服日二覆取汗不汗更合加麻黃五兩

○以麪密塞之勿令泄氣一頭內大豆一

顆并艾燒令然灸七壯即瘥患右灸左

患左灸右千金不傳耳病亦可灸之

○鼠屎形橫安之兩頭下大

○枳茹酒主諸藥不能瘥者方

枳實上青刮取末欲至心止得茹五升

微火炒去濕氣以酒一斗漬微火暖令

得藥味隨性飲之主口僻眼急大驗治

緩風急風並佳肘後以治身直不得屈伸反覆者枳樹皮亦得

○治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷

或憎或癱或身強直不語或生或死狂言不

可名狀角弓反張或欲得食或不用食或大

小便不利皆療之方古今錄驗名八風續命湯

○秦艽散治半身不遂言語錯亂乍喜乍悲角

弓反張皮膚風癩方

○秦艽

獨活

黃耆

○人參

甘菊花各二兩

洽用馬齒

○防風

石斛胡洽用草薢各一月山茱萸桂心各一兩半

芎藭胡洽用防風各一兩半

半夏麥門冬各一升白薇

附子當歸白木

黃芩

甘草

芍藥各四兩

白鮮皮胡洽用白芍各三十錢

乾薑

麻黃

石膏五兩

生薑二兩

大棗二十枚

五味子各三十錢甘草

天雄

酒一升

風痺第八

日三服

右十味㕮咀內前汁中煮取六升服一升

今盡

右二十二味治下篩酒服方寸七日再漸
漸加至二七又云治風無新久并補

吳茱萸散治風注入肢體百脉身腫角弓反
張手足酸疼皮膚晝夜痛眉毛墮落
耳聾驚悸心滿短氣魂志不定陰下濕瘡大
便有血小便赤黃五勞七傷萬病皆治

論曰血痺病從何而得之師曰夫尊榮人骨
弱肌膚盛因疲勞汗出卧不時動搖加被微
風遂得之形如風狀葉原云其狀如風所吹但以脉
自微澀澀在寸口關上緊宜針引陽氣今脉
和緊去則愈

○治風濕脉浮身重汗出惡風方

甘草二兩黃耆五兩漢防已四兩

生薑二兩白朮各三兩大棗十二枚

右六味㕮咀以水六升煮取三升分三服

服了坐被中欲解如蟲行皮中卧取汗

鐵精湯治三陰三陽厥逆寒食胃脹支滿病
不能言氣滿胃中急肩息四肢時寒熱不隨
喘悸煩亂吸少氣言轉飛騰虛損方

黃鐵三十斤以流水八斗燒之三千度人參三兩

炭五十斤燒鐵今赤燒冰水復燒七遍如此浸清取汁二斗煮藥

莽草各半兩烏頭各半兩杜仲半兩

甘草

○黃耆湯治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中
小緊外證身體不仁如風狀方

○日三服令盡

○黃耆湯治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中

小緊外證身體不仁如風狀方

右二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭身中熱行爲候十日便覺

治風痺遊走無定處名曰血痺大易方

草薢

薯蕷

牛膝

澤瀉各二兩

地膚子

白朮各半兩

乾棗

蟾蜍

狗脊

車前子

天雄各半兩

茵芋六錢

山茱萸三十枝半兩

乾地黃

右十四味爲末蜜和丸如梧子大酒下十丸日三後稍加

○治諸風痺方

防風

甘草

黃芩

桂心

當歸

茯苓各一兩

秦艽

葛根各二兩

生薑五兩

大棗三十枚

杏仁五十枚

右十一味㕮咀以酒水各四升煮取三升分三服取汗

附子酒治大風冷瘻痺脹滿諸痺方

大附子一枚重二兩者亦云二枚酒五升漬春五日每服一合日再以瘥爲度

麻子酒治虛勞百病傷寒風濕及婦人帶下月水往來不調手足疼痺著牀服之令人肥

健方

麻子石一兩

法麵斗

右二味先搗麻子成末以水二石著釜中

蒸麻子極熟炊一石米傾出滓隨汁多少

如家釀法候熟取清酒隨性飲之

○孫真人備急千金要方卷之二十八

孫真人備急千金要方卷之二十九 切牛
宋朝太常少卿王叔微等整理校讎等正

傷寒方

傷寒例第一

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之

迹無方性命之功難測故有炎涼寒燠風雨

晦冥水旱妖災蟲蝗怪異四時八節種種施

化不同七十二候日月運行各別終其晷度

方得成年是謂歲功畢矣天地尚且如然在

人安可無事故人生天地之間命有遭際時

有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡

憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬

計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一

日不憂喜故有天行瘟疫病者即天地變化

之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故

聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不

能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝

生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯

瘻癰還以天地所生之物以防備之命曰知

方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病