

孫真人備急千金要方卷之三十七 麻七

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

肝臟方

筋極第四 論法 方

論曰夫六極者天氣通於肺地氣通於噬風

氣應於肝雷氣動於心穀氣感於脾素問教作谷也

雨氣潤於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之氣所以竅應於五臟五臟邪傷則六腑

生極故曰五藏六極也

論曰凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝

有病從筋生又曰以春遇病為筋痺筋痺不

已復感於邪內舍於肝則陽氣入於內陰氣

出於外若陰氣外出則虛虛則筋虛筋虛

則善悲色青蒼白見於目下若傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春甲乙

日得之傷風風在筋為肝虛風也若陽氣內

發發則實實則筋實筋實則善愁嗌乾傷熱

曰肝實風也然則因其輕而移之因其重而

減之因其衰而彰之審其陰陽以別柔剛陽

病治陰陰病治陽善治病者病在皮毛肌膚筋脉而治之次治六腑若至五臟則半死矣

扁鵲云筋絕不治九日死何以知之手足爪

甲青黑呼罵口不息筋應足厥陰足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌筋先死矣

橘皮通氣湯治筋實極則欬欬則兩脇下縮痛痛甚則不可轉動方

橘皮兩 細辛一 白朮二 石膏各五

當歸一 桂心一 生玄參汁升 大黃一

升麻兩 犀角各三 麻黃一 茄子仁一

茯苓兩 香豉升 石膏五 芍藥四

丹參三 芸菊一 杜仲一 去滓取二升分三服

右八味㕮咀以水九升煮取三升去滓分

丹參散治筋實極則兩脚下滿滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折痛不可忍者方

取三升分三服日再

右十味㕮咀以水七升先煮七物取二升去滓次下地黃汁煎一兩沸次下葛汁煎

五加酒治筋虛極筋痺好悲思顏色蒼白四肢嗜吸脚手拘攣伸動縮急腹中轉痛方

五加皮一 大麻仁三 丹參八 杜刺升

續斷一 地骨皮二 乾地黃一 芍藥五

當歸一 通草一 麻黃各一兩 天雄一

牛膝二兩 甘草一兩 桂心一兩 通草四

生薑切炒 索牡蠣各二兩半

右十五味㕮咀以絹袋盛清酒四斗漬春

右十七味治下篩為粗散以絹袋子盛二方寸匕以井花水二升煮數動袋子叢取一升頓服日二

地黃煎治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏頭四肢筋急煩滿方

右十七味治下篩為粗散以絹袋子盛二方寸匕以井花水二升煮數動袋子叢取一升頓服日二

地黃煎治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏頭四肢筋急煩滿方

夏四日秋冬六七日初服六七合稍稍加

人參酒治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛
數轉筋或交接過度或病未平復交接傷氣
內筋絕舌捲脣青引卵縮肝脉疼急腹中絞
痛或便欲絕不能飲食方

熬解臍足髓內瘡中筋即續

勞冷氣逆腰籠冷痺脚屈伸難灸陽蹻一百壯在外踝下容爪

所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成故積者陰氣也其始發有常處其痛一作病也不離其部上下有所終始左右有所窮已聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚也

故以是別知積聚也

經絡受病入於腸胃五臟積聚發伏梁息竇

肥氣否氣奔豚積聚之始生至其已成奈何

曰積之始生得寒乃生厥止乃成積人之善

病腸中續者何以候之曰皮薄而不擇肉不

不潔而稱者何以他們之日以清而不潔而不

堅而淖澤如此則腸胃傷惡惡則邪氣留止

積聚乃作腸胃之積寒溫不次邪氣稍止至

其畜積留止大聚乃起病有身體腰髀股行

其有病自知方易不趁形有身體肺骨脛脉
背腫環瘠而滿是謂何病曰兩石伏吳七人

皆腫塊而痛是謂何病曰瘀名伏梁此風

根也不可動動之爲水漏瀉之病小腹盛左

右上下皆有根者伏線也。環環血筋腸胃之

外不可治者但藥也裏膜血居腸胃之

外不可治。治之每如被之錢死此下則因陰

必下 膽血上則迫胃管生
王水云當作出 脫俠胃管

內癰此久病也難療居臍上為運慎勿動亟

李其氣溢於大腸而著於肓肓之原在膂下

不復能於衣服而著於臍育之屬在腰下

右二十二味咬咀鍾孔別以小袋子盛清酒二斗半浸五宿溫服三合日再不知隨意增進一本無烏麻用杜仲一兩半治交接損卵縮筋攀方燒婦人月經衣灰服方十七治筋絕方

又云灸下滿各五十壯老人加之小兒隨。壯法。又云此二穴喉腫厭逆五臟所苦鼓脹悉以主之。轉筋腰骨痛不可忍發屈膝下廉橫筋上三壯。腹脹轉筋灸脐上一寸二七壯。堅癥積聚第五論方。論曰病有積有聚何以別之答曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沈而伏陽浮而動氣之

根也。不可動，動之爲水渴瀦之病。小腹盛左
右上下皆有根者，伏梁也。裹脰血居腸胃之
外，不可治。治之每切按之致死。此下則因陰
必下。脰血上則迫胃管生。王水云出 脊作脰。脰胃管
內癰此久病也。難療。居臍上為逆慎勿動。亟
奪其氣溢於大腸而著於肓肓之原在臍下。

故環臍而痛

三台圓治五臟寒熱積聚臍脹腸鳴而噫食
不生肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘞已愈全不
復發食後服五丸飲多者十九常服今人大
小便調和長肌肉方

大黃蜜

前胡各二兩

消石

附子

杏仁各一升

厚朴

李蘋半兩

細辛

半夏各一兩

右十味為末蜜和擣五千杵丸如梧子大

○服五丸稍加至十九以知為度

五石烏頭圓治男子女人百病虛弱勞冷宿
寒久癖及癥瘕積聚或嘔逆不下食并風濕
諸病無不治之方

鍾乳蜜

硫黃

礬石

紫石英

赤石脂

枳實

甘草

白朮

紫菀

山茱萸

防風

白薇

桔梗

天雄

皂莢

細辛

蕤 苓

人參

○右三十二味為末蜜和擣五千杵丸如梧
子大酒眼十九日三稍加之

○烏頭圓治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往
來厥逆搶心心痛痙攣吐下不止婦人產後
羸瘦方

附子

藜蘆各一兩

蜀椒

吳茱萸

黃芩

大黃

茯苓六錢

桂心

人參

蜀椒

乾薑

甘草

大黃

茯苓兩半

桂心

細辛

乾薑

六錢

兩

○烏頭十五

吳茱萸

蜀椒

烏頭十五

乾薑

桂心各二兩

前胡

桂心各二兩

細辛

人參

蜀漆

柏山

桂心

附子

鰐甲

白朮

貝齒各一兩

蠶蟲

六錢

○右二十味為末蜜丸如梧子大服五丸日
再漸加之

○恒山圓治肠下邪氣積聚往來寒熱如溫瘡

○方

恒山

蜀漆

白薇

白朮

桂心

附子

鰐甲

白朮

桂心

附子

鰐甲

白朮

貝齒各一兩

蠶蟲

六錢

兩

一

○右十一味為末蜜丸如梧子大以米泔清
服五丸日三

○又方蒸鼠壤土熨之冷即易腹中切痛炒鹽

半升令焦內湯中飲之大吐瘻若手足痛者

燒青布內小口器中薰痛處

神明度命圓治久患腹內積聚大小便不通

氣上搶心腹中脹滿逆害飲食方

大黃

芍藥各二兩

右二味為末蜜丸如梧子大服四丸日三不知可加至六七丸以知為度

治萬病積聚方

七八月收葵藜子不限多少以水煮過熟取滓曝令乾搗篩蜜丸如梧子大酒服七丸以知為度其汁煎如飴服之

陷胃湯治胃中心下結積飲食不消方

桔梗實 大黃 黃連各一兩

甘草一兩 右四味㕮咀以水五升煮取二升五合分

三服

太乙神明陷冰圓治諸疾破積心下丈滿

寒熱鬼注長病欬逆嘔噫辟除衆惡殺鬼逐邪氣惡晉中結氣咽中閉塞有進有退繞脣側側隨上下按之挑手心中溫溫如有蟲狀

毒注相染滅門

雄黃油黃一日

丹砂

礬石

蜈蚣一枚

桔梗一兩

杏仁三十枚 地膽十五枚 巴豆十八枚

牽牛一兩

桑螵蛸一枚

地膽十五枚

半夏二兩

芫花二兩

防己二十枚

巴豆二十枚

蜥蜴圓治癥堅水腫蠶尸百注疽注尸注骨血相注惡氣鬼忤蟲毒邪氣往來夢寐存亡留飲結積虎狼所嚙猢犬所作鷙毒入人五臟服藥以消殺其毒食不消婦人邪鬼忤亦能達之方

右二十四味為末蜜和搗三萬杵丸如小豆大先食飲服二丸日二不知稍加仍以藥二丸安門戶上令衆惡不敢近家及視病人夜行獨宿服二丸今衆惡不敢近傷

腹方

大黃 薑茶 人參

當歸 乾地黃各四兩

細辛 附子

蜀椒

五味子

蘭茹各一兩

桂心各一兩

厚朴

半夏二兩

乾薑

芫花二兩

旋復花各半兩

杏仁三十枚

右二十一味為末蜜和丸如梧子大服二

當歸 大黃各二兩 巴豆一兩 射罔

澤漆 桑赤雞

鬼督郵八株

芍藥各一兩

虎骨各一兩

甘草

六錢

犀角

人參

附子各一兩半

乾薑各一兩

甘遂一兩

澤漆

六錢

藜蘆兩半

牛黃

杏仁四十枚

斑蝥七枚

桂心

三兩

重方

麝香

烏頭八枚

地膽各三枚

蜥蜴一枚

芫青五枚

重方

重方

蜈蚣一枚

桂心各一兩

桂心三十枚

桂心三十枚

桂心三十枚

桂心三十枚

桂心三十枚

當歸

人參各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

鬼臼

人參各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

當歸各半兩

烏頭八株

烏頭八株

烏頭八株

烏頭八株

烏頭八株

烏頭八株

烏頭八株

附子兩半

附子兩半

附子兩半

附子兩半

附子兩半

附子兩半

附子兩半

巴豆一兩

巴豆一兩

巴豆一兩

巴豆一兩

巴豆一兩

巴豆一兩

巴豆一兩

射罔

射罔

射罔

射罔

射罔

射罔

射罔

鬼臼

鬼臼

鬼臼

鬼臼

鬼臼

鬼臼

鬼臼

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

當歸

大黃各二兩

大黃各二兩

大黃各二兩

大黃各二兩

大黃各二兩

大黃各二兩

大黃各二兩

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

澤漆

桑赤雞

桑赤雞

桑赤雞

桑赤雞

桑赤雞

桑赤雞

桑赤雞

鬼督郵八株

鬼督郵八株

鬼督郵八株

鬼督郵八株

鬼督郵八株

鬼督郵八株

鬼督郵八株

先日二夜一以知為度

小狼毒圓治同前

狼毒三兩

附子

旋復花

半夏

蘭茹

白附子各二兩

右六味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大

數服三丸加至十九日三時後方無半粒

狼毒圓治堅癬方

狼毒五兩

半夏

杏仁各三兩

桂心四兩

附子

蜀椒

細辛各二兩

右七味為末別搗杏人蜜和丸如大豆飲

服二丸

甘遂湯治暴堅久瘡腫有堅方

甘遂

黃芩

礎硝

桂心一兩

細辛一兩

大黃三兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升半分三

眼

治卒暴瘻腹中有物堅如石痛如研刺晝夜
呻吟不治百日必死

牛膝二斤㕮咀曝令乾以酒一斗浸之

密塞器口煎取半服半升一服便吐去

宿食神效

擣碎商陸根蒸之以新布籍腹以藥鋪

著其上以衣物覆其上冷易之數日用

之旦夕勿息

又方

蒜十斤取五月五日戶上者去皮

桂二尺

電中黃土如雞子大一枚

右三味合搗以淳苦酒和塗布上以掩病

處不過三日消足痔亦佳時後方不用桂

野葛青治卒暴瘻方

野葛一尺

當歸

附子

雄黃油浸一日

細辛各一兩

蜀椒半兩

右八味㕮咀以大醋浸一宿猪膏二斤煎

附子色黃去滓內雄黃粉攪至凝傅布上

以掩瘻處復以油重布上復著十重紙以

熨斗盛大著其上常令熱日三夜二須膏

消石大圓治十二癥瘕及婦人帶下絕產無
子并欲服寒食散而腹中有癥瘕實者當先
服大丸之後與寒食散大丸不下水穀但
下病耳不令人困方

消石六兩朴大黃八兩人參
甘草兩桂二尺

右四味為末以三年苦酒三升置銅器中
以竹筋柱器中一升作一刻凡三升作三
刻以置火上先內大黃常攪不息半使微
沸盡一刻乃內餘藥又盡一刻餘一刻極
微大使可丸如雞子中黃凡合藥當先齊
戒一宿勿令小兒女人奴婢等見之欲下
病者用二丸若不能服大丸者可分作小
丸然亦不可過四丸也丸欲令大不欲令
細能不分為善若人羸者可少與強者可
二十日五服和調半日乃下若婦人服之
下者或如雞肝或如米汁正赤黑或一升
或三升下後慎風冷作一杯粥食之然後
作羹臍自養如產婦法六月則有子禁生

魚猪肉辛菜若寒食散者自如藥法不與

此同日一服

土瓜圓治諸藏寒氣積聚煩滿熱飲食中盡
毒或食生物及水中蟲卵生入腹而成蟲蛇
若為魚蠶留飲宿食婦人產瘕帶下百病陰

陽不通利大小便不節絕傷墮落寒熱交結
脣口焦黑身體消瘦嗜卧少食多屬產乳胞
中餘疾股裏熱少腹中急結痛引陰中方

○ 土瓜根 桔梗各半 杏仁半升

大黃一斤蒸二斗水下鹽丸

右四味為末蜜丸如梧子大空腹飲服三
丸日三不知加之以知為度

取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去
宿食即瘥有食桃不消作病者以時無

桃就樹間得槁桃燒服之發時吐病出
甚良

○ 治卒食不消欲成癥積方

煎艾汁如鈍取半升作一服便利吐去

宿食神良古今錄驗方白艾五尺同煎

○ 治食魚肉等成癥結在腹內并諸毒氣方
狗屎五升燒末綿裹以酒一斗浸再宿
濾取清分十服日三三日今盡隨所食
癥結即出

○ 治雜食癰實不消心腹堅痛方
以水三升煮白鹽一升令消分三服刺
吐去所食并治暴癰

○ 治癰堅心下有物大如杯不得食金則腹滿

心腹絞痛方

○ 萍蘚子 大黃兩各二兩澤漆四兩

○ 右三味別研萍蘚為膏其一味搗五百杵

入蜜更搗千杵和丸如梧子大服五丸不

知加之日三

○ 治小腹堅大如盤曾中滿服食不消化婦人
瘦瘠方

○ 以暖水服蠻灰一方寸七日再并灸肋

又方飲服上好麴末方寸七日三爻灸三焦

○ 輸隨年壯瘡

○ 治伏梁氣方

端

○ 白馬屎銅器中盛取每旦服一升

○ 治癰腫方

○ 檵樹白皮煎令可丸服之取知病動若
下減之

○ 沖熨方治患癰結病及瘡似瓜形日月形
或在臍左右或在臍上下或若龍在左右肋
下或當心如合子大法先針其足以椒熨之

○ 取一新金子受一斗者底鑽一百二十

孔孔上著椒三合上著一重紙紙上著

○ 今灰一升冷灰上著熱灰半升上著剛

炭火一斤經一食噴盆底熱徹當病上

初安禮一重即安火盆火盆大熱以漸

更加一重若火更熱不可忍加至三重

○ 停止經三日勿著及至七日決得頓瘡

○ 然後食美食自補若小不瘥作露宿丸

○ 服之別卷

○ 治腹中積癥方

○ 萍蘚子一升熬以酒五升浸七日每服

三合日三

治蛇癥方

白馬尾切長五分以酒服方寸匕大者
自出更服二分者一方寸匕中者亦出
更服三分者一方寸匕小者復出不可
頓作一服殺人馬尾一本作馬毛

大黃湯治蛇癥方

大黃各半兩 茯苓本作黃芩 烏賊骨一枚 鬼莢六枚如雞子者 甘草如指大一枚

芒硝如雞子一枚

右六味㕮咀以水六升煮三五沸去滓內

○消通寒溫盡服之十日一劑作如上法宿

勿食平旦空腹服病根當下也

治鼈癥腹堅硬腫起大如盆眼卧不得方食

在心下堅強得病為鼈癥

取藍一斤擣水三升绞取汁每服一升

日二

又方蒴蘆根白皮一握研取汁以水和頓服

之又方白馬屎一升雞子三枚取白合煎取二

合空腹頓服不移時當吐病出

又方雞屎一升炒令黃取五合以酒一升浸

取半搗為末以所浸酒服方寸匕日二服三

日中作一劑

治蛟龍病開皇六年三月八日有人食莽得食寒食腸過多便吐出秋以蛟龍有頭而有尾

十六

服寒食餠三斗大驗

山野人有嘴蟲在腹生長為鼈癥病治之方

故敗鼯子

故敗梳

右二件各破為兩分各取一分燒為末又

取一分以水五升煮取一升服上件燒末

○頓服即出

常欲食米若不得米則胃中清水出為米癥

治之方

雞屎一枚

白米合五

右二味合炒令米焦搗末以水二升頓服

取盡須臾吐出病如研末若無米當出液

自此永絕不復食之矣

死

食中有髮不覺因食而入久即胃間如有蟲
狀下去來惟欲飲油一日之中乃至三
升不欲飲食者為髮癥方

以油一升以香澤煎之大鋸勞貯之安
病人頭邊令口鼻臨油上勿令得飲傳

鼻而令有香氣當呼喚取飲不得與之

必當發極大睡其髮散當從口出令一

人專守視之并備石灰一舉見癥出以

灰粉手捉癥抽出及盡即是髮也初從

腹中出形如不流水巾濃糞隨髮長短

○形亦如之

又方酒三升煮豬脂二升三沸服一升日二

白馬屎服之亦佳無白馬屎白牛屎亦得

灸法

癥瘕灸內踝後宛宛中隨年壯又灸氣海百

壯

久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利繞臍絞痛灸天

樞百壯三報穴在俠臍兩邊各二寸勿針

積聚堅滿灸脾募百壯穴在章門季肋端

心下堅積聚冷服灸上管百壯三報穴在巨

關下一寸

積聚堅大如盤冷脈矣胃管二百壯三報穴
在巨關下二寸

孫真人備急千金要方卷之三十七

孫真人備急千金要方卷之三十八 痘人

宋朝皇帝太常少卿龍溪後裔傳等鑒

膽腑方

膽腑脉論第一

論曰膽腑者主肝也肝合氣於膽膽者中清

之腑也甲乙云膽者清淨之腑也

號將軍決曹
吏重三兩三鉢長三寸三分在肝短葉間下

貯水精汁二合難經作三合能怒能喜能剛能柔

目下界大其膽乃橫凡膽膾髓骨脉女子胞

此六者地氣之所生也皆藏於陰而象於地

三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天

故渴而不藏此受五臟濁氣名曰傳化之腑

此不能久留輸瀉者也所謂五臟者藏精氣

甲乙云作中而不渴故滿而不能實六腑者傳化物

而不藏故實而不能滿所以然者水穀入口

則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也

左手關上陽絕者無膽脉也若膝疼口中苦

病若實極則傷熱熱則驚動精神而不守卧

在足大趾間或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也若腹中不安身軀

習習也刺足少陽治陽在足上第二趾本節

後一寸是也

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人

轉搘之咽中介介然數唾候在足少陽之本

末亦見其脉之陷下者灸之其寒熱刺陽陵

泉若善嘔有苦長太息心中澹澹善悲恐如

人將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣

逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下因氣逆

刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其

邪也

膽脹者脇下痛脹口苦太息

肝前受病移於膽肝欬不已則嘔膽汁

厥氣客於膽則夢鬱訟甲乙云作

問詮自別

肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄

爪堅色青者膽急爪赤者膽緩爪直色

白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結

扁鵲云足厥陰與少陽為表裏表清裏濁其