

孫真人備急千金要方卷之四十一

宋朝秦郎守太常少卿充秘閣校理林德等校定

三

又方燒牛角灰和豬脂傅之
又方擣黑椹取三升服日三
令髮不生方

小腸腑方

婦
女
傳

不生也

治鬼謠頭方

燒貓兒屎以臘月猪脂和傅上

又方猫兒毛燒灰以膏和傅人手轉之四蒜瓣轉日一夜

曾損當歸湯治心腹溫溫然痛方

卷三

黃芩

柴胡各四

右七味㕮咀以水八升煮取二升半分三

卷二

穀應主二十四氣也。難經云十六山氣數二
之太半申巳云受三合合之太半
小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛時窘之復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱若脉滑者麻經作陷此其候也。

卷之四十三

小腸控掌引肺有上衝心邪在小腸者連掌
系屬於督貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝
腸胃動肝肺散於肓結於臍故取之肓原以
散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛
下廉以去之按其所過之經以調之

左手關前寸口陽絕者無小腸脉也苦膚痺
小腹中有疝瘕王月即冷上搶心刺手心主
治陰心主在掌後橫文中入一分
左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急
熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太陽治陽手
太陽在手小指外側本節陷中
小腸有寒其心下重便膿血有熱必痔
小腸有宿食常暮發熱明日復止
小腸脹者小腹膜脹引腹痛
心前受病移於小腸心欬不已則氣與欬俱
出
厥氣客於小腸夢聚邑街衢
心應皮皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者
脉薄脉薄者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小
腸大而長皮薄而脉沖小者小腸小而短諸
陽經脉皆多紓屈者小腸結
扁鵲云手少陰與太陽為表裏所以表清裏
濁清賓濁虛故食下腸實而胃虛故腑實而
不滿實則傷熱熱則口張口為之生瘡虛則
傷寒寒則便泄膿血或發裏水其根在小腸

先從腹起方見治水篇中

小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻
不得屈伸白汗不止

手太陽之脉是動則嗌痛頸腫不可以顧肩
似拔膚似折是主液所生病者耳聾目黃頰

頸腫頸肩膚肘臂外後廉痛經脉支別已

小腸虛實第二脉方

灸法

灸法

右七味為末蜜和丸如梧子大飲服大人
七丸小兒二三丸日二熱去日一服

小腸泄滿矣陰都隨年壯穴俠中管兩邊相
去一寸是也

小腸泄病脹血多塊含一百壯小兒減之穴

在俠脇兩邊相去各一寸異云相去一寸又灸小腸

輪七壯

小腸虛寒

左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也

病苦頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

治小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊憹補之

方

乾薑三當歸

黃藥

前卷既有頭面風方風眩不當分出思邈

蓋以此是徐嗣伯方不可以餘方相雜故

此特立風眩方條專出徐氏方焉

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治

備闡之矣自謂風眩多途諸家未能必驗至

於此術鄙意偏所究也少來用之百無遺策

今年將衰暮恐奄忽不追故顯明證論以貽

於後云爾

論曰凡舌者心主小腸之候也舌重十兩長

七寸廣二寸半善用機衡能調五味也凡有

所啖若多食鹹則舌脈凝而變色多食苦則舌

皮槁而外毛焦枯多食辛則舌筋急而爪

枯乾多食酸則舌肉肥而脣揭多食甘則舌

根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸

脾欲甘腎欲鹹比五味內合五臟之氣也若

舌燥熱則舌生瘡引脣揭赤若腑寒則舌本縮

口噤脣青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依

臟腑調之舌縮口噤脣青升麻煎主之方見

○

別卷

風眩第四灸禁方

右七味咬咀以水一斗煮取二升去滓去

滓下膠囊取膠烊盡分三服

大黃圓治小腸熱結喘不通方

大黃三芍藥二葶藶各二

朴硝三杏仁十五

大戟

舌論第三

夫風眩之病起於心氣不定胃上蓄實故有
高風面熱之所為也痰熱相感而動風風心
相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癲小兒則
為癇其實則一此方療治萬無不愈但恐證
候不審或致差違大都忌食十二屬肉而資

兩已服續命湯口開四肢尚未好定而心中尚不除者紫石湯主之方見後紫石羹散是也

| | | |
|-----|------|------|
| 葛根 | 薯蕷 | 參各四 |
| 生地黃 | 麥門冬 | 參各四 |
| 枳實 | 前胡 | 芍藥各八 |
| 茯苓 | 遠志 | 生薑各三 |
| 甘草 | 茯神各六 | 分三 |
| 黃芩 | 半夏 | 竹葉各二 |
| | 五 | 分二 |

脉為患，發多氣急，氣急則死，不可救，故此一湯是輕重之宜勿因此便謂非患所治。風眩湯散丸煎丸有十方。凡人初發宜急與續命湯也。困急時但度灸穴，便火針針之，無不瘥者。初得針竟便灸最良。灸法次列于後。余業

之以來三十餘年所救活者數十百人無不
瘥矣後人能曉此方幸勿參以餘術焉

綠翁移居屏賜教則煩悶無知口沫出四體
角弓目反上口噤不得言方

竹瀝
二合
生地黃汁
一升
升龍齒
四兩
方風
麻黃
各四

全臺防已
附子 分三
附子 分三
石膏 分七

桂心
兩

有氣加附子作一兩紫蘇子五合橘皮半

防已地黃湯治言語狂錯眼目霍亂或言見鬼精神客亂方

防已 甘草 桂心

防風各三兩 生地黃五斤剝切勿合藥漬病小輕用二斤

右五味㕮咀以水一升漬一宿絞汁著一
面取滓著竹簾上以地黃著藥滓上於五
斗米下蒸之以銅器承取汁飯熟以前
藥汁合絞取之分再服

薯蕷湯治心中驚悸而四肢緩頭面熱心胃
痰滿頭目眩冒如欲搖動方

右十六味㕮咀取江水高舉手搗三百九
十下量取三斗煮米減一斗內半夏復減
九升去滓下藥煮取四升分四服無江水
處以千里東流水代之校手今上頭也秦
中無江水涇渭水可用諸葛灌効由尚取
之

| | |
|-----|-----|
| 防風 | 石膏 |
| 赤石脂 | 白石脂 |
| 龍骨 | 寒水石 |
| | 生薑 |
| | 茯苓 |

桂心分二
紫石分一

服凡用井花水者取清淨也今用江水無
泥又無砂穢源泉遠涉順勢歸海不逆上

泥又無砂穢源泉遠涉順勢
流用以治頭必歸於下故也

薯蓣煎方

薯蕷二十分 甘草十四分 澤鶴

人參
黃芩 分四
當歸

白欵 桂心 防風

麥門冬 分三
山茱萸 桔梗

芍藥
紫苑
大豆英

乾地黃 白朮 茯苓

乾薑

生地黃十八斤
汁煎令餘半升，取

鹿角膠 各一兩 **大棗** 八枚 **麻子仁** 一錢

桑根皮 五升者大者一束

邊者皆不中用也

二十七味以清酒二斗四升煮之

水子棗得一斗去滓次下地黃汁

不減半內前諸末併煎令可丸如鈍

大飴膈一枝日三粒加至三丸

| | | |
|--|------|-----------------------|
| 上黨人參 | 鬼臼 | 鐵精 |
| 牛黃 | 丹砂 | 雄黃 |
| 大黃 | 菖蒲 | 防風 <small>各一兩</small> |
| 蜥蜴 | 赤足蜈蚣 | |
| 右十一味爲末蜜丸如梧子大用前菊花酒服七丸日三夜一稍加之合藥勿用青紙忌見婦人青衣人喪葬不具足人及渴 | | |

○其法以繩橫度口至兩邊既得口度之寸數。便以其繩一頭更度鼻竇其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中層之取半合於口之全度中層之先覓頭上迴髮當迴髮爻之以度度四邊左右前後當繩端而爻前以面為正並依年壯多少一年凡三爻皆須瘡瘍又爻壯數如前若連爻火氣引上其數處迴髮者則爻其近當鼻也若迴髮近額者亦宜爻若指面為嚴則關其面頰然病重者亦不得計此也

虎兔龍蛇牛馬豬羊雞犬猴鼠

右十二相屬肉物皆不得食及以爲藥牛

黃龍骨齒用不可廢

孫真人備急千金要方卷之四十四

穀四

宋朝奉郎守太常少卿光祿閣待郎林億等校正

尾骶也

骨癩疾者頸齒諸輸分肉皆滿而骨倨強直

汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不療

腸腑方

風癲第五針灸法

孫真人備急千金要方卷之四十三

岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故今子發為癲

疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癲初

發歲一發不治月一發不治四五日一發名

曰癲疾刺諸分其脉尤寒者以針補之病已

止癲疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作

極已而煩心候之於顙取手太陽陽明太陰

血變而已癲疾始發而反強因而脊痛候之

是太陽陽明太陰手太陽血變而已癲疾始

作而引口啼呼流言甲乙作者候之手陽明太陽

右強者攻其左左強者攻其右血變而止治

癲疾者常與之居察其所當取之處病至視

之有過者即寫之置其血於幹壺之中至其

發時血獨動失不動灸窮骨二十壯窮骨者

筋癩疾者身拳掌急脉大刺項大經之本杼
脈癩疾者暴仆四肢之脉皆脹而從滿脉盡
刺之出血不滿俠項灸太陽又灸帶脉於腰
相去三寸諸分肉本輸嘔多涎沫氣下泄不
療

治癩者病發而狂面皮厚敦敦者死不療

凡癩發則卧地吐涎沫無知若強掠起如狂

及遺糞者難療

癩疾脉搏大滑久自己脉沉小急實死不療

小牢急亦不可治脉虛可療實則死矣厥成

為癩疾五臟不平六腑閉塞之所生也厥成

為癩故附厥於此條也陰衰發熱厥陽衰發

寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣裏於下則為寒厥陰氣裏於下則為熱

厥問曰熱厥必起於足下者何也對曰陽氣