

孫真人備急千金要方卷之六十六 仁六

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

癰疽第二

論法二首 熨法三首 方八十七首

脉數身無熱即內有癰  
諸浮數脉當發熱而反洗洗惡寒若有痛處

當結爲癰

脉微而遲必發熱脉弱而數此爲振寒當發

脉浮而數身體無熱其形默默胃中微燥不

知痛處其人當發癰腫

脉滑而數滑則爲實數則爲熱滑即爲榮數  
即爲衛榮衛相逢即結爲癰熱之所過即爲

癰腫身體有痛處時時苦有瘡

問曰寸口脉微而澀法當亡血若汗出設不  
汗者當云何答曰若身有瘡被刀器所傷亡

血故也

趺陽脈滑而數法當下重少陰脉滑而數婦  
人陰中生瘡

論曰夫癰疽初發至微人皆不以爲急此實  
奇患惟宜速治稍遲緩乃即病成以此致禍

者不但發背外皮薄爲癰外皮厚爲疽宜  
急治之

凡癰疽始發或似小瘡或復大痛或復小痛  
或發如米粒大白膿子此皆微候宜善察之

見有小異即須大驚忙急須攻治及斷口味  
速服諸湯下去熱毒若無醫藥處即灸當頭  
百壯其大重者灸四面及中央二三百壯數  
灸不必多也復薄以冷藥種種救療必速瘥  
也

凡用藥帖法皆當瘡頭處其藥開孔令洩熱  
氣亦當頭以火針針入四分即瘥

凡癰疽瘤石癰結筋癰腫皆不可就針角針  
角者少有不及禍也

凡癰無問大小已覺即取膠如手掌大暖水  
浸令軟納納然稱大小當頭上開一孔如錢  
孔大帖腫上令相當須臾乾急若未有脈者  
即定不長已作膿者當自出若以鋒針當孔  
上刺至膿大好至瘡乃洗去膠

凡膿廣一寸已下名瘡一寸已上名小癰  
如豆粒大者名皰子皆始作急服一香連翹  
食肉膏散惡肉盡後傳生肉膏散及摩四邊

湯下之數劑取瘡乃止

凡癰高而光大者不大熱其肉正平無尖而  
繁者不須攻之但以竹葉黃耆湯申其氣耳  
肉正平爲無膿也癰卒痛以八味黃耆散傳  
之大癰七日小癰五日其自有堅強者寧生

破發乳若熱手不可得近者先內服王不留  
行散外摩發背膏若發生破無苦在乳宣令  
極熱候手按之隨手即起者瘡熟也須針之

針法要得著膿以意消息留背不過一寸斟  
量不得膿即與食肉膏散著先頭內癰口中

如體氣熱歇即服木占斯散五日後癰欲著  
癰者即服排膿內塞散

凡癰破之後便綿懶欲死內寒外熱腫自  
有似癰而非者當以手按腫上無所連乃是

風毒耳勿針之宜服升麻湯外摩膏破癰口  
當令上留三分近下一分針之務令極熱熱  
便不痛破後敗壞不差者作猪蹄湯洗之日  
二度夏用二日冬用六七日用湯半劑亦可

夫癰壞後有惡肉者宜猪蹄湯洗去穢次傳  
食肉膏散惡肉盡後傳生肉膏散及摩四邊

令好肉速生當斷絕房室忌風冷勿自勞煩

待筋脉平復乃可任意耳緣新肉易傷傷則

裏潰潰則重發發即難收慎之慎之白痴最

忌

凡諸暴腫一不同無問近遠皆服五香連

翹湯刺去血小豆木傳之其間數數以針刺

去血若失療已潰爛者猶服五香湯及漏蘆

湯下之隨熟多少依方用之外以升麻湯搗

洗尉之升麻湯方見另篇若生息肉

者以白蘭茹散傳之青黑肉去盡即停止好

肉生傳升麻膏如肌不生傳一物黃者散若

傳白蘭茹青黑惡肉不盡者可以搾頭蘭茹

散半錢和白蘭茹散三錢稍稍傳之其散各

取當色單擣下篩直爾成散用之此散法參驗用治頭疽

或身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰氣痛

痛不可忍遊走不住發作有時痛則小熱痛

定則寒此皆由久時受溫氣至春暴寒風來

折之不成溫病乃作氣痛宜先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煎楊柳皮及暖熨之

有赤氣熱點者即刺出血也其五香連翹湯

及小竹瀝湯可服數劑勿以一劑未瘥便住藥以謂無效即禍至矣中間將白薇散佳又

有氣腫痛其狀如癰腫無頭虛腫色不變但

皮急痛不得手近亦須服此五香湯次白針寫之次與蒺藜散傳之

胷中痛短氣者當入闇室中以手指擦左眼

視若見光者胷中有結癰若不見光者是癰

痘內發出也

經云氣宿於經絡中血氣俱滯不行擁結爲

癰痘也不言熱之所作其後成癰又陽氣湊

熱被寒冷搏之而脉凝結不行熱氣擁結成

癰痘方有灸法亦有溫治法以其中分未成

熱之時其用冷藥帖薄之治熱已成以消熱

今不成膿也赤色腫有尖頭者薰葦膏傳之

一云醋和蚌蛤灰塗乾則易之

余平生數病癰痘得效者皆即記之考其病

源多是藥氣所作或有上世服石遂令子孫

多有此疾食中尤不宜食麵及酒蒜及慎溫

林厚被能慎之者可得終身無他此皆躬自

驗之故特論之也

五香連翹湯治一切惡核瘰癧痘惡腫患

背方

青木香

沈香

丁香

薰陸香

麝香

射干

升麻

連翹

獨活

寄生

通草

大黃

附方

右十二味㕮咀以水九升煮取四升內竹

瀝二升更煮取三升分三服取快利

附方

紫葛甘草無通草治惡核風結

附方

腰氣痛要籍帶義有黃耆甘草芒硝各六

附方

小兒癰毒瘡

附方

升麻

麥門冬

附方

人參

當歸

附方

黃芩

甘草

附方

半夏

生薑

附方

大棗

淡竹葉

附方

十四味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉

取一斗去滓內藥煮取三升分四服相去

附方

八味黃耆散方

黃耆

芎藶

大黃

黃連

芍藥

莽草

黃芩

梔子仁

甘草

隨腫大小傳之乾則易若已開口封瘡上  
右八味治下篩雞子白和如泥塗故帛上  
須開頭令歇氣

王不留行散治癰腫不能潰因苦無聊賴方

王不留行子

金合子

龍骨

當歸

金合子

野葛皮

乾薑

桂心

金合子

桔梗根

右七味治下篩食後溫酒服方寸七日三  
以四肢習習爲度不知稍加之令人安穩  
不覺脹自潰即著瘡平復神良此浩仲  
堪方隋濟閣叅所名爲神散癰腫即消全  
內補散治癰疽發背婦人乳癰諸癰未潰者  
便消不消者令速潰疾愈方

昇雲治癰疽及諸  
癰疽已潰皆服之

木占斯 人參 乾薑地黃丸  
桂心 細辛 厚朴

桔梗 防風 桂心  
遠志 白芷 甘草

敗醬 桔梗 甘草

各一兩

枯萎根

右十一味治下篩酒服方寸七藥入咽覺  
流入瘡中若癰疽炎之不能發壞者可服  
之未壞者去敗醬已發膿者內敗醬服藥  
日七八服夜二三服以多爲善若病在下  
當膿血出此爲腸癰也諸病在裏惟服此  
藥即覺其力痛者即不痛長服治諸瘡及  
疽瘡瘡已潰便早愈醫人不知用此藥發  
背無有治者若始覺背上不好處而渴  
者即勤服之若藥力行覺渴止便消散若  
雖已壞但日夜服之勿住藥腫自消散不  
覺去時欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜  
速服之一方無桂心一名木占斯散主癰

瘡堅結若已壞者速愈未壞者使不成癰  
又方治癰疽發十指或起膀胱及發背後生  
惡肉者方

人參 萍根 赤小豆  
黃耆 附子 甘草  
當歸 厚朴 桂心

右十四味治下篩酒服方寸七日三夜一  
猪蹄湯治癰疽發背方

黃耆

各一兩

厚朴

各一兩

桂心

各一兩

當歸

右七味㕮咀以水三斗煮豬蹄令熟澄清  
取二斗下諸藥煮取一斗去滓洗瘡一食  
項以帛拭乾帖生肉膏日一如痛加當歸  
甘草各二兩

獨活 萍根 赤小豆  
芒草 附子 甘草  
黃芩

右八味㕮咀以水三斗煮豬蹄取八升去  
之內諸藥煮取四升去滓潰瘡兩食噴洗  
之拭令乾傳麝香膏

麝香膏治癰疽及發背諸惡瘡去惡肉方

硫黃  
丹砂  
麝香

乾地黃

麝香  
礬石  
薑黃

檉頭蘭苑  
馬齒莧

右十味㕮咀以醋半升漬一宿次日猪膏三斤煎令沸三上三下膏成塗之立瘥

右四味治下篤以猪膏調如泥金之惡肉  
盡止却傳生肉膏

**右八味治下篩以粉之免食惡肉薄帖千金萬  
無白薯略黃有蕷薑云折齊和傳之又萬  
癰瘍在篇無丹砂廣濟方療癰腫膜潰瘍**

**蛇精治癰瘡敗壞者方**

食惡肉膏方

人方簡錄

黃連  
黃耆  
黃芩

真珠	白欵	雌黃	附子
蘭茹各威		礬石	生用各
雄黃	附子	黃芩	生用各
雨半			雨

硫黃分製  
右四味治下篩內瘡中惡肉盡即止不得  
過好肉也

右十一味㕮咀以猪脂一升半煎五六沸。  
去滓内簡茹礬石末攬調傳之瘡中惡肉。

**生肉膏治癰疽發背壞後生肉方**

右十八味㕮咀醉漬再宿臘月猪脂七升。  
煎三上三下酢盡下之去滓取傳日二夜。

治癰腫惡肉不盡者方  
盡乃止

**當歸**  
**大黃**  
**白芷**  
**首烏**  
**芍藥**

此有大妙能治各一症。黃者續斷。白芨。苦参。白芷。甘草。

**右二味各淋取汁合煎如膏膏成傳之食  
蒴**一作  
蕷**灰**一作  
蘆灰

黃芩 繢斷各處 薑白

而非使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺人  
仁六  
青木香 蕙香 薰陸香

惡肉亦去黑子此藥過十日不中用

芷黃下之去滓傳之立瘥

沉香 丁香 各一錢

度

烏啄  
生用  
陸分  
蕤  
蛇  
嘶  
雨  
蜀椒  
細辛  
各處  
蘿白  
蘿蔔  
桔梗

不瘥更服并以滓傅腫上  
千金翼以麝代麝香

漏蘆

麻黃

白芨

黃芩

獨活

枳實

白朮

前乾易之妙

藜蘆膏治赤色腫有尖頭者方

藜蘆

黃連

礬石

升麻

葛根

防己

甘草

茵芋

雄黃

松脂

丹黃

黃芩

防風

秦艽

麻黃

桂心

桂枝

射干

白朮

枳實

秦艽

麻黃

桂心

桂枝

射干

白朮

白朮

秦艽

麻黃

桂心

又方持馬鞭草傳上即頭出

又方灸兩足大拇指中立瘡仍隨病左右治癰始覺腫令消方

大黃

通草

葶藶

莽草

通草

葶藶

右四味各等分爲末以水和傳上乾則易之又方以芒若末三指撮水和服之日三神良治癰方

右用芫花爲末膠和如粥傳之治癰方

右取乾牛糞燒灰治下節以雞子白調塗之乾復易

若已結膿使聚長者方右用枯萎根爲末苦酒和傳上燥復易赤小豆亦佳

治癰有膿令潰方右用雞羽三七枚燒末服之即潰又方人乳和麪傅上比曉膿血盡出不用近手

又方箔經繩燒末臘月猪脂和傳下畔即潰不須針灸

治癰腫發背初作及經十日已上腫赤嫩熱毒氣盛日夜疼痛百藥不效方

煅雞子

新出狗屎

如雞子大

新出狗屎

如雞子大

紫葛

分量

大黃

分量

青木香

分量

由跋

合

玄參

分量

白斂

分量

黃連

分量

榆白皮

分量

升麻

分量

由跋

合

赤小豆

分量

合

松脂膏

分量

治癰腫方

由跋

合

右十一味治下節以生地黃汁和泥傳

右十一味治下節以生地黃汁和泥傳  
腫上乾則易無地黃汁與米醋和之  
由跋

大黃

分量

黃芩

分量

黃連

分量

當歸

分量

芍藥

分量

芎藶

分量

由跋

合

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上  
三下綿及布絞去滓火炙傳紙上隨腫  
之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟  
日一度拭去膏上膿再帖至瘥止

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上  
三下綿及布絞去滓火炙傳紙上隨腫  
之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟  
日一度拭去膏上膿再帖至瘥止

大黃

分量

黃芩

分量

黃連

分量

當歸

分量

芍藥

分量

芎藶

分量

由跋

合

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上  
三下綿及布絞去滓火炙傳紙上隨腫  
之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟  
日一度拭去膏上膿再帖至瘥止

大黃

分量

黃芩

分量

黃連

分量

當歸

分量

芍藥

分量

芎藶

分量

由跋

合

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上  
三下綿及布絞去滓火炙傳紙上隨腫  
之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟  
日一度拭去膏上膿再帖至瘥止

大黃

分量

黃芩

分量

黃連

分量

當歸

分量

芍藥

分量

芎藶

分量

由跋

合

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上  
三下綿及布絞去滓火炙傳紙上隨腫  
之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟  
日一度拭去膏上膿再帖至瘥止

大黃

分量

黃芩

分量

黃連

分量

當歸

分量

芍藥

分量

芎藶

分量

由跋

合

右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上

芍藥

茯苓

乾橘各處

人參

天門冬

兩伍

右十四味爲末塞丸如梧子大酒服十九日三夜一加至二十九久服延年終身不發癰疽凡方中用大黃薄切五升米下蒸

熟曝乾用之熟多倍大黃要清俞義  
地黃前補虛除熱散乳石去癰瘍痔疾悉宜服之方

生地黃隨多少三擣三壓取汁令盡銅

器中湯上煮勿蓋覆令泄氣得減半出

之布絞去粗碎結濁滓再煎令如錫。

九如彈丸許酒服日三勿加之百日癰

疽未不發

枸杞煎治虛勞軀身益氣令人有力一切癰疽未不發方

枸杞三十斤剉葉生至未落可用莖葉落至未生可用根以水一石煮取五斗去滓淀將滓更入釜與水依前煮取五斗并前爲一斛澄清去淀釜中煎取二斗許更入小銅鍋子煎令連連如錫止

或器盛重湯煮更好每日早朝服一合

半日再初服一合漸加

治風濕體痛不能飲食兼癰疽後補虛羸方

薔薇根 枸杞根各一斤食蜜

生地黃

各一斤

右四味㕮咀先以水煮二根令味濃取二解去滓次內地黃煮令爛絞去滓微火煎

令如粥次內塞耗令相得每食後服如彈丸許

○ 搽腫方

大黃 黃芩 白欽

研各一斤

右四味㕮咀以水六升煮取三升故帛四重蘸汁中以搗腫處乾即易之無度數晝夜爲之

○ 又方治癰腫煩悶方

右用生枳葉十重帖之以帛裹令緩急得所日二易止痛兼消腫膿甚良勝於他物如冬月先收乾者臨用以鹽潤之亦可薄削楸皮用之

○ 又方治大人小兒癰腫方

右用生豬腦傳紙上帖之乾則易日三四度

又方芥子爲末湯和傳紙上帖之千金具以楮又方白蘆石末蒜和搗傳上

黃藥

白欽各一斤

地黃汁

麝香

研各一斤

右十六味㕮咀以水五升煮取二升小冷故帛兩重蘸湯中搗腫處乾即易之日夜數百度

○ 又方治頭項及胷背有大腫亦發即封之令不成腫方

朴消

研各一斤

生地黃汁

右三味合搗黃令地黃爛熟傳腫處厚二分日三四易至瘥止此兼治一切腫

又方擣馬鞭草傳上即頭出

又方灸兩足大拇指趾中立瘻仍隨病左右

治癰始覺腫令消方

大黃

通草

草薢

莽草

通草

草薢

右四味各等分爲末以水和傳上乾則易

又方以蕘若末三指撮水和服之日三神良  
治癰方

右用芫花爲末膠和如粥傳之

○治癰疽發腹背陰匿處通身有數十癰者方。  
右取乾牛糞燒灰治下節以雞子白調塗

之乾復易

若已結膿使聚長者方

右用枯萎根爲末苦酒和傳上燥復易赤

小豆亦佳

治癰有膿令潰方

右用雞羽三七枚燒末服之即潰

又方人乳和麪傅上比曉膿血盡出不用近  
手

又方箔經繩燒末臘月豬脂和傳下畔即潰

不須針灸

治癰腫發背初作及經十日已上腫赤焮熱

毒氣盛日夜疼痛百藥不效方

蠅雞子

新出狗屎

如雞子大

右二味攪調和微火熬令稀稠得所捻作

餅子於腫頭堅處帖之以紙帖上以帛抹

之時時看視覺餅子熟即易勿令轉動及

歇氣經一宿定如多日患者三日帖之一

日一易至瘥止此方穢惡不可施之貴勝

○然其愈疾一切諸方皆不可及自外諸方。

還復備貟設儀往而已學者當曉此方以

備諸急爾

烏麻膏治諸漏惡瘡一十三般丁腫五色遊

腫癰癧毒熱狐刺蛇毒狂犬蟲狼犬畜所傷

不可識者二十年漏金瘡中風皆以此膏帖

之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟一

日一度拭去膏上膿再帖至瘥止

生烏麻油

黃丹

蠅子

四分皆大

兩大斤

右三味以臘日前一日從午內油銅器中

微火煎至明旦看油減一分下黃丹消盡

下蠅令沫消藥成至午時出惟男子合之

毋令小兒女人六畜等見

治諸腫帖方

紫葛

分拾

大黃

分半

青木香

分半

大黃

分半

白斂

分半

黃芩

分半

榆白皮

分半

升麻

分半

黃連

分半

赤小豆

分半

玄參

分半

白斂

分半

黃芩

分半

當歸

分半

松脂膏

分半

治癰腫方

右十一味治下節以生地黃汁和泥傳

腫上乾則易無地黃汁與米醋和之

松脂膏

分半

治癰腫方

松脂

分半

猪脂

分半

黃芩

分半

黃連

分半

芍藥

分半

當歸

分半

黃耆

分半

太黃

分半

蠅子

分半

細辛

分半

大黃

分半

防風

分半

黃芩 菖蒲 白欵  
當歸 芍藥 莼草  
黃藥 白芷 黃連各半

右十五味㕮咀先煎二脂白蠟令烊次內  
諸藥三上三下以綿及布絞著水中爲餅  
取少許火炙之傳油紙上帖瘡處二十  
千金翼有黃者

治癰疽痔漏惡瘡婦人奶乳癰瘡方

野葛 芍藥 蕤白  
當歸 通草各半 附子分量

○右六味㕮咀醋浸半日先煎猪脂八合令  
煙出內亂髮二分令消盡下之待冷又內  
松脂八分蠟二分更著火上和次內諸藥  
煎令沸三上三下去滓以故帛傳藥帖腫  
上乾即易如春月去附子其髮須盡洗去  
垢不爾令人瘡痛

青龍五生膏治癰疽痔漏惡瘡膿血出皆以  
此方導之  
生梧桐白皮 生桑白皮 生青竹茹  
生柏白皮 生龍膽各半 蜂房

猬皮 蝉蛻皮 雄黃  
雌黃各半 蜀椒 附子  
菖蒲各半

右十三味㕮咀以三年苦酒二斗浸一宿  
於炭火上炙乾搗下細篩以猪脂二升半  
微火煎搗令相得如餌著米水中新白甕  
器中盛稍稍隨病深淺傳之并以清酒服  
如棗核大日一

減瘢膏治諸色癰腫惡瘡瘻後有瘢痕方

安息香一作女姜 磬石 狼毒

羊蹄蹠 烏頭 附子

野葛 皂莢 白芷

天雄 菖蒲 赤石脂

當歸 莼草 大黃

續斷 地榆 白朮

巴豆

細辛各半

右二十六味搗末用成煎猪脂四斤和以  
此爲準煎三上三下以好鹽一大匙下之

膏必須服者與服須摩者與摩摩之忌近  
眼服之忌姪姪人若減瘢者以布揩令傷  
傳之鼻中息肉者取如大豆內鼻中如瘀  
血者酒服如棗核大痔漏者以綿裹如梅  
子大內下部中風者摩患上取瘡崩中者  
亦內其減瘢取少許和鷹屎白傳之取臘  
日合神效千金翼有石蠅而

治膿漬後瘡不合方

右燒鼠皮一枚爲末傳瘡孔中

又方熟嚼大豆以傳之

又方牛屎傳之乾即易

又方燒破蒲席灰臘月猪脂和內孔中

治癰久不瘥方

右用馬齒菜搗汁煎以傳之

治癰瘻潰後膿不斷及爲諸物刺傷瘡不瘥  
方

石硫黃粉糊

右一味取筋一片砸碎頭少撮內硫黃中  
以刺瘡孔瘡瘻爲度

治癰肉中如眼諸藥所不效者方

右取附子削令如葵子安腫上以唾帖以火灸之令附子欲焦復唾濕以火灸之如是三度令附子熱氣徹內即瘥此法極妙也

練石散治癰有堅如石核者復大色不變或作石癰方

麌理黃石粒鹿角

白歛

右三味以醋伍升先燒石灰赤內醋中不限數醋減半止總搗末以餘醋和如泥厚傳之乾則易取消止盡更合諸漏及瘰疬

其藥悉皆用之仍火針針頭破傳藥又單磨鹿角半夏末傳之不如前方佳也

右用生商陸根熟搗傳之乾即易取軟爲度又治濕漏諸癰癰

又方蜀桑根白皮陰乾搗末拌膠以酒和藥傳腫根即拔

又方蔓荳子爲末醋和以傳瘡頭根即拔又方蛇蛻皮帖之經宿便瘥

又方櫟子一枚以醋於青石上磨之以塗腫

上乾更塗不過十度即愈

又方梨上塵

葵根莖灰各等

右二味醋和傳之即瘥

又方當上炎百壯石子當碎出如不出益壯

乃佳

根者名曰石癰

禁腫法

凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲聲

止乃止後七日勿洗手此後有一切腫及

蠍蟻惡注腫瘡摩之隨手即消

書腫方

天乙

甲一未

乙一不戊

壬癸死

右以丹書閉氣書腫上立瘥

治惡毒腫或著陰卵或著一邊疼痛攀急引入小腹不可忍者一宿殺人方

以取茴香草搗汁飲一升日三四服滓傳

腫上冬月關生者根亦可用

此是外國神方於永嘉年

未用之起死

治風勞毒腫疼痛攀急或牽引小腹及腰髀

右三味各等分爲末傳之日三

大蒜

鼠屎

書墨

右用桃仁一升研如常法以酒三升攪和頓服之厚衣被蓋令汗不過三劑瘥

治腳腫向上至腹即殺人者方

右用赤小豆一斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每日一度瘥止若已入腹

不須浸但煮豆食之忌鹽菜米麯等渴飲汁瘥乃止

麻子小豆湯治毒腫無定處或赤色惡寒或心腹刺痛煩悶者此是毒氣深重所致方

麻子

赤小豆

升各伍

生商陸升各半

附子

射干

升麻

右六味㕮咀以水四斗先煮四味取二斗半去滓次研麻子碎和汁煮一沸濾去滓取汁爛煮豆其汁每服五合日二夜一當利小便爲度腫退即瘥并食豆

治一切腫毒疼痛不可忍者方

以取草麻子熟搗傳之即瘥

治諸瘡著白痴復發方

治癆子方

凡癆無頭者吞葵子一枚不得多服

又方生椒末

金下土

右二味各等分醋和鹽之糲全翼有題

又方狗頭骨

芸薹子

右二味各等分爲末醋和鹽之糲

二十三

又方燒葛蔓灰封上自消牛糞灰封之亦佳

又方鼠粘根葉帖之

又方水和雀屎傳之

孫真人備急千金要方卷之六十六

孫真人備急千金要方卷之六十七 仁七

宋朝太常少卿光裕閣授林億等校正

發背第三

論一首

方十五首

論曰凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而

自發者此是上代有服之者其候率多於背

兩肺間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色

人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至

於死其臨困之時已濶三寸高一寸瘡有數

十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所

以養生者小覺背上癢痛有異即火急取淨

土水和泥捻作餅子厚二分闊一寸半以

粗艾大作炷灸泥餅上帖著瘡上灸之一炷

一易餅子若粟米大時可灸七餅子即差如

榆羹大灸七七餅炷即差如錢大可日夜灸

之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵散諸藥

攻之乃愈又法諸發背末作大膿可以冷水

射之浸石令冷熨之日夜莫住差乃止此病

忌麴酒五辛等亦有當兩肩上發者

凡服石人皆須勞役四體無令自安如其不

爾者多有發動亦不得逐便恣意取暖稱已  
適情必須遺欲以取寒凍雖當時不寧於後  
在身多有所益終無發動之慮耳

凡腫起背胛間頭白如黍粟四邊相連腫赤

黑令人悶亂即名發背也禁房室酒肉蒜髮

若不炎治即入內殺人若灸當瘡上七八百

壯有人不識多作雜腫治者皆死

治發背及癰腫已潰未潰方

右用香豉三升少與水和熱搗成強泥依

腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布

豉餅以艾列其上灸之使溫溫而熱勿令。

破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩

一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出

即瘥

治癆疽發背已潰未潰及諸毒腫方

桔梗根

二十一

榆白皮

胡燕窠

鼠全土

右四味各等分爲末以女人月經衣水洗  
取汁和如泥封腫上乾即易潰者四面封  
之已覺即封從一日至五日令瘥