

治癆子方

凡癆無頭者吞葵子一枚不得多服

又方生椒末

金下土

右二味各等分醋和鹽之糀全具有趣

又方狗頭骨

芸薹子

右二味各等分爲末醋和傅之

又方燒葛蔓灰封上自消牛糞灰封之亦佳

又方鼠粘根葉帖之

又方水和雀屎傳之

孫真人備急千金要方卷之六十六

孫真人備急千金要方卷之六十七 仁七

宋朝太常少卿光裕閣授林億等校正

發背第三

論一首

方十五首

論曰凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而

自發者此是上代有服之者其候率多於背

兩肺間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以爲事日漸長大不過十日遂至

於死其臨困之時已濶三寸高一寸瘡有數

十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所

以養生者小覺背上癢痛有異即火急取淨

土水和泥捺作餅子厚二分闊一寸半以

粗艾大作炷灸泥餅上帖著瘡上灸之一炷

一易餅子若粟米大時可灸七餅子即差如

榆羹大灸七七餅炷即差如錢大可日夜灸

之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵散諸藥

攻之乃愈又法諸發背末作大膿可以冷水

射之浸石令冷熨之日夜莫住差乃止此病

忌麴酒五辛等亦有當兩肩上發者

凡服石人皆須勞役四體無令自安如其不

爾者多有發動亦不得逐便恣意取暖稱已
適情必須遺欲以取寒凍雖當時不寧於後
在身多有所益終無發動之慮耳

凡腫起背胛間頭白如黍粟四邊相連腫赤
黑令人悶亂即名發背也禁房室酒肉蒜髮

若不炎治即入內殺人若灸當瘡上七八百

壯有人不識多作雜腫治者皆死

治發背及癰腫已潰未潰方

右用香豉三升少與水和熱搗成強泥依

腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布

豉餅以艾列其上灸之使溫溫而熱勿令。

破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩

一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出

即瘥

治癆疽發背已潰未潰及諸毒腫方

桔梗根 榆白皮 胡燕窠

鼠全土

右四味各等分爲末以女人月經衣水洗

取汁和如泥封腫上乾即易潰者四面封

之已覺即封從一日至五日令瘥

治發背背上初欲結腫方

大黃

升麻

黃芩

甘草各參
雨

梔子參
雨

厚朴
甘草
桂心
芍藥各
當歸各
葛根各
附子各
黃芩
芍藥各
葛根各
附子各
黃芩
芍藥各
葛根各
附子各
黃芩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服

取快利便止不利更進

內補散治癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸

桂心各
雨

人參

芎藭

厚朴

防風

甘草

白芷

桔梗各
全

○右九味治下篩酒服方寸七日三夜二末

痘更服勿絕
外臺無防風

又方治癰疽發背方

蜀椒

乾薑

黃芩

人參各
分
雨

桂心分
雨

小豆蔻合

白欵

甘草

附子
三

防風各
雨

芎藭各
雨

半夏各
伍

○右十一味治下篩酒服方寸七日三夜二

李根皮散治癰疽發背及小小癰疽方

李根皮

桔梗根

通草

白欵

桔梗

治發背方

升麻膏方

右用亂髮灰酒服方寸七亦治癰疽
又方猪脂傳上日四五度亦治發乳
片脂切作片冷水浸帖上暖易之伍
若切少許即寒寒定好眠甚妙

云取豬脂傳上
三年醋淬微火煎令稠和牛脂傳上

又方燒古蚌灰雞子白和傳之日三易

又方燒鐵漿二升取利

又方蛇頭灰醋和傳之日三易

又方燒鹿角灰醋和傳之日四五易

丹毒第十四論一
方三十八首

○論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之。

色大者如手掌甚者徧身有癰有腫無定色

有白丹者肉中腫起癢而復痛微虛腫如吹

狀隱轉起也有雞冠丹者赤色而起大者如

連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟如雞冠肌

理也一名茱萸丹有水丹者由遍體熱起遇

水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在皮中

喜著股及陰處此雖小疾不治令人至死治

之皆用

升麻

白薇白薇作漏蘆

連翹

礎硝

黃芩各處

蛇嘴

枳實各處

蒴蘿各處

右十味微搗碎以水三升浸半日以猪膏

右十三味或搗成末單用一味立瘥
又方凡天下極冷無過藻菜最冷但有患熱
毒腫并丹等取渠中藻菜細切熱搗傳之
厚三分乾即易

已上取一味下水和用
右取榆根白皮爲末雞子白和傳之千金
用雞子白和
又方搗大麻子水和傳之
又方以煎羊脂摩之得青羊脂最良集驗方
面白身體卒赤黑丹起如疥
不治日創搗身即收人

治諸丹神驗方

右以苦薹葉熱搗厚封之隨手即消如餘
熱氣未愈復三日內封之使醒醒好瘥止

縱乾亦封之勿歇以絕本余以正觀七年

治小兒丹毒方
右搗馬齒莧一握取汁飲之以滓傳其上
又方搗赤小豆五合水和取汁飲一合良以
滓塗五心

三月八日於內江縣飲多至夜睡中覺四

又方濃煮大豆汁塗之良瘥後亦無瘢痕
又方臘月豬脂和釜下土傳之乾即易

○體骨肉疼痛比至曉頭痛目眩額左角上。
冷以故帛染汁搗諸丹毒上常令濕搗後
須服飲子并漏蘆湯方並見前癰腫條中

治小兒五色丹方
右用豬槽下爛泥傳之乾則易集驗方治
辛赤黑丹

○右六味㕮咀以水一斗浸良久煮取七升。
冷以故帛染汁搗諸丹毒上常令濕搗後
須服飲子并漏蘆湯方並見前癰腫條中

又方搗蒴蘿葉傳之
又方服黃龍湯二合并傳患上佳

單方

水苔

生蛇嘴

生地黃

生菘菜

蒴蘿葉

慎火草

五葉藤

豆葉

浮萍

太黃

梔子

黃芩

已上取一味單搗塗之

治赤流腫丹毒方

未以痱子
白和坐之

世云耳

治五色油丹方俗名油膿苔化者

右用燒猪屎灰雞子白和傳之良

治小兒白丹方

右用燒猪屎灰雞子白和傳之良

右搗苦薹葉汁服三合滓傳上良

千金集驗

治小兒赤丹斑駁者方

右以唾和胡粉從外向內傳之

又方銀鐵屎以猪脂和傳之

又方屋塵以臘月猪脂和傳之

治小兒大丹赤如朱走皮中方

右以醋和豉研傳之

又方鯉魚血傳之良

又方搗荳子傳之良

又方猪屎水和絞取汁服少許良

治小兒天大毒肉中有赤如丹色大者如手

甚者偏身或痛或癢或腫方

右用赤小豆二升以水二升煮取汁浴之

治小兒朱丹火丹初從足趺起正赤色者方

右以桑白皮二升以水二升煮取汁浴之

治小兒骨大丹其瘡見骨方

右搗大蒜厚封之著足踝者是

治小兒殃大丹毒著兩脣及腋下者方

右用伏龍肝爲末油和傳之乾則易若入

腹及陰以慎火草取汁服之

治小兒尿竈丹初從兩股起及臍間走入陰

頭皆赤色者方

右切桑白皮二升以水二升煮取汁浴之

良

右切桑白皮二升以水二升煮取汁浴之

右用赤小豆爲末以粉之如未成瘡者雖子白和以傳之

治小兒癰竈火丹初從足趺起正赤色者方

右以桑根煮汁沐浴五六度

治小兒朱丹火丹病一日一夜即成瘡先從

背起漸至偏身如瘡大正赤色者方

右用濃荳棘根汁洗之已成瘡者赤小豆

末傳之未成瘡者雞子白和小豆末以傳

凡方中用雞子者皆取先破者用之完者

論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發

散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄

行之則爲瘡也所以有風轉搔瘡皆由於此

又有赤轉者忽起如蚊蚋啄煩癢極者重沓

龍起搔之逐手起又有白轉者亦如此赤轉

熱時即發冷即止白轉天陰冷即發白轉宜

煮荳石汁拭之或煮蒴蘿和少酒以浴之良

或煮石南汁拭之良餘一切如治丹方法俗

呼爲風瘡亦名風戶

治小兒野火丹病偏身皆赤者方

右用油塗之

治小兒茱萸丹病初從背起偏身如細綿一

石南湯治六十四種風淫液走人皮中如蟲

行腰脊強直五緩六急手足拘攣隱轉搔之

作瘡風戶身癢卒面目腫起手不得上頭口

噤不能言方此方但是隱轉宜服

治風瘡隱轉心迷悶亂方

天雄

牛膝

桂心

黃連

黃芩

細辛

知母各半錢

桔梗根

白朮各伍分人參各半錢

乾薑

右八味吹咀以水一斗煮取三升洗之日

三良

右十味治下篩酒服半錢七加至一七爲

又方馬蘭子

茺蔚子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

防風各半錢人參各半錢細辛各半錢

又方牛膝爲末酒下方寸匕日三并治骨疽

日三

癩瘍及瘡癰

又方芥子末漿服方寸匕日三

又方巴豆二兩以水七升煮取三升故帛染

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

汁拭之大人小兒以意加減

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

又方礬石二兩爲末酒三升漬令消帛染拭

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

度

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

又方吳茱萸一升酒五升煮取一升半帛染

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

治搔癩皮中風虛方

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

又方丹參一升

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

又方白朮各半錢

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

又方白朮各半錢

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

度

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

又方白朮各半錢

羊桃

菟葵子

茵芋

又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞

度

滓內裹石以帛染拭之

又方灸曲池二穴小兒隨年壯發即灸之神

良

治風癰腫瘡瘻在頭面搗洗方

大黃

硝各半升

莽草

甘草各兩分一作

黃連

生者七分

黃芩

生者七分

蒺藜子

合分一作

右六味㕮咀以水七升煮取三升去滓下消以帛染搗洗日一度勿近目

治身體赤隱軫而癢搔之隨手腫起方

莽草

甘草各半升

蒺藜子

合分一作

當歸

芎藺

五度

大戟

細辛

芍藥

右二味

蜀椒

附子

猪膏

流升

芫花

勝芻

芒消

各半升

躄躅

各半升

細辛

流升

右取十味

㕮咀

以酒漬一宿

猪膏煎之候

附子色黃煮成去滓

以傳病上日三

青羊脂膏

治風熱赤軫搔之逐手作瘡方

甘草

芍藥

各半升

寒水石

白芷

白蘂

防風

黃芩

黃耆

升麻

各半升

竹葉

力

石膏

各半升

孫真人備急千金要方卷之六十七

右十二味㕮咀先以水八升煮石膏竹葉取四升去滓浸諸藥以不中水猪脂二升

合煎膏成傳病上良

癰疽第六

方十五條

孫真人備急千金要方卷之六十八

矣

宋朝奉郎守太常少卿光祿閣校理林衡等校正

論一首

論曰瘰疽者肉中忽生點子如豆粒小者如粟粒極者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經久便四面悉腫飽熟紫黑色能爛壞筋骨若毒散逐肺入臟殺人南人名爲搗著毒厚

肉處即割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵根汁或飲藍青汁若犀角汁及

升麻汁竹瀝黃龍湯等諸單方治專去其熱

取瘥其病喜著十指故與代指相似人不識

之呼作代指不急治之亦逐肺上入臟殺人

南方人得之皆斬去其指初指頭先作點疮

後始腫赤黑黯瘻痛入心是也

代指者先腫瘀熱痛色不黯緣爪甲邊結膜

劇者爪皆脫落此謂之代指病也但得一物

冷藥汁搗漬之佳若熱盛服漏蘆湯及搗漬

之傳升麻膏亦可針去血不妨洗漬塗膏也

復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出