

急救仙方卷之九

秘傳五痔品

開九

原痔者貧富男女皆有之富者酒色財氣
貧者擔輕負重飢露早行皆心肝二血喜
則傷心怒則傷肝喜怒無常風血侵於大
腸到穀道無出路結積成塊出血生乳各
有形相婦人因經後傷冷月事傷風餘血
在心經血乃流入於大腸小兒因利後或
母腹中受熱也治方于後

水澄膏

金

白芨各一兩一
加黃連

右二味爲細末候內痔發出在外用

溫湯洗淨不須坐入即側卧床沿上用新
水和蜜調令稀稠用蓖桃葉輕手塗穀道
四邊好肉上只留痔頭在外用薄紙圓轉
蓋藥上仍用筆蘸溫水塗紙上紙以護水
澄膏不令四散耳才覺藥乾又用溫水潤
之後用枯藥

好白礬四
分細為

生信石二錢
半
硃砂一錢
研十分

妙細為

右各研爲細末先用碗在建蓋中次用白

礬末蓋之用大煅令煙斷其碗盡隨煙去
止借碗氣於礬中耳用礬末十分細
可也看痔頭大小用礬末在掌上入生硃
砂少許以唾調稀用籠頭塗痔上周徧一

日三上須子細看痔頭顏色焦黑爲妙至

夜有黃水出切勿他疑水盡爲妙至中夜

上藥一徧末日依然上藥三次有小痛不

妨換藥時以碗盛新水或溫湯在痔邊用

筆一管輕洗刷痔上去舊藥上新藥仍用

護藥此藥只是借碗信又有硃砂少解砒

毒次用荆芥湯洗之三兩日之後黃水出

將盡却於藥中增硃砂減白礬則藥邊緩

矣三兩日方可增減漸取之庶不驚人

全在用藥人看痔頭轉色增減厚薄傅藥

方是治法

荆芥湯

右用荆芥剉水三碗煎下如洗痔
了依然傾入瓶內大煨之可用三五次

潤腸丸

大黃酒紙包
炭
研去枳殼去
核當歸蜜

右三味等分爲末蜜丸每服二十九或三十
丸湯下量臟腑虛實多寡服之緣爲已
用枯藥後痔頭將欲焦枯冀門迫急恐大
便堅難下所以預服此令臟腑稀滑耳

龍石散

龍骨研去
大毒香白芷

好黃丹

右等分爲極細末候痔頭落盡以此藥擦

收斂瘡口預先備好血竭末止血或敷瘡

軟石膏研去
大毒

○口倉卒要用耳

導赤散

生地黃二
兩黃芩三
兩

右剉每服三錢水一盞煎六七分溫服用

藥之後小便恐赤澁即服之加滑石甘草

燈心研去
三分

雙金散

黃連

黃芩

右二味等分爲末極細用蜜水調傅痔頭

上虛人已用枯藥上忽有些疼痛用此其

止一方只用腦子末傳亦可

內補散此藥調理氣血排膿生肌候瘡將欲收斂即服此所謂腸頭直候瘡口安好血氣中和自然收入

人參

黃耆

當歸各二

桔梗

苦蘚

厚朴

甘草各一

白芷

甘草各一

○國老湯甘草煎湯常需要煎下薰洗痔瘡蓋右十味各等分爲細末木香湯溫酒亦可日二三服

○國老湯甘草煎湯常需要煎下薰洗痔瘡蓋甘草自是痔藥又解砒毒若瘻收斂其痒異常尤要此藥澆洗溫熱隨意

○催生治痔雖硬只是不脫用此藥催自落百草霜二 白姜末一 川烏頭

○右爲細末以井水調稀以筆點痔上良久

立脫

熨法

丸醫痔用枯痔藥後急大小便間好內疼如針刺及痛上腎根令人將衣物火上烘

之令熱熨痛處三五次其痛立止

病更除根

用喚藥用此

水澄膏蓋慮痔根毒水流汙好肉生瘡故用

藥塗油單紙護內周徧不用連紙貼定可也

喚痔

真磁石

另研水飛

白姜各一錢

白礬半錢

枯梗

桔梗

○右爲末却以葱涎調傅腸頭上其乳出用

草烏尖

另研水飛

白礬一錢

大草烏

川山甲

朋砂

○右未如前出用洗藥

又方磁石

另研水飛

白礬一錢

枯梗

○右爲末每用二錢班猫三箇香油一兩同

一處煎斑猫巴豆赤爲度去二味只用油調藥未成膏子看大小貼之一二日一次換藥至六七日看焦黑不用塗用推藥末

○破已破用紙襯子任藥入瘡爲妙

金花散

此藥酒色氣風食五事過度

○痔證分三八憲君子細看糞數年日久見者

○膽心寒羨角看形煙蓮花不可觀穿腸并鼠妓酒色兩相干莫顧翻花怒峰窠亦不寬雌

雄同氣血子母及腸盤玄珠由可惺勾腸痛無名異

另研

黃藥一錢

○右爲末溫洗了用海蛤散傅

○龍骨海蛤散

無名異

另研

黃連

另研

○右爲末溫洗了用海蛤散傅

○龍骨

另研

海蛤各一錢

○右爲末先炒次用貼痔膏日一次貼

○乳膏膏

另研

○右爲末先炒次用貼痔膏日一次貼

○乳膏膏

茱萸

白芨

白��

黃連

黃藥

當歸各等

荆芥穗一兩
右為末每服一錢水一盞姜蜜同煎八分
入鹽虛心服

洗腸犀角散

骨碎補

川山甲粉二兩

甘草根

玄胡索生用

右為細末茶調半錢空心服

止痛參煎散

滑石錢

蟬甲半兩

川烏去皮尖

○右為末每二錢小參三十五粒同煎至七分溫

分通口服不拘時三四服見効

黑神黃耆散

京墨一錢

黃牛角隻蛇蛻一條

檳榔三

川山甲

蔓荆子

人參

斑蝥去頭足

鵝絃

大黃

杜鵑

枳殼各等

收膿膏

海金砂

乳香

白芨

茴香

葫蘆巴

朱砂各一

大黃

芒硝

丁香

草澄茄

冰片

冰糖

收膿膏

海金砂

乳香

白芨

右研勻醋糊丸如梧桐子大用一錢重木

右為末以瓜蒌五箇去子入藥在內用新瓦瓶盛之後用黃泥固濟大煅烟盡末入

瓜蒌不思食

右為末以瓜蒌五箇去子入藥在內用新瓦瓶盛之後用黃泥固濟大煅烟盡末入

苦參一兩蓬莪术炮益智仁

乳香

赤石脂

龍骨各一錢
生用

右為末擦瘡口以乳香膏塗之一日二次
如瘡口乾只用乳香膏貼有清水出用後

藥注青膏

注青膏

五倍子三箇
生

玄胡索
八錢

各一

右為末服少許如清水出以紙貼膏藥入
瘡口內

金花散

甘草炙

白姜炮
八錢

各一

右為末每服二錢空心陳米飲下

山甲散

五倍子生

川山甲炒存性

各一

右為末每服二錢空心陳米飲下
治痔久不差變漏不成酒色服藥耳治則
先用紙燃子細看大小淺深即服通真丸
黃耆散以紙燃貼紅肉膏入瘡一日五六
次用乳香膏入作燃子貼瘡口日一次三
五次進藥入瘡內凡取爛肉有血水出方
不進藥須用收腸膏三日後用藥洗三日

解腸散治藏毒瀉血

藏靈仙

蕤生焰
一錢

白礬
一錢

各一

右為末每服二錢麝香酒調服

凡內痔用蔥涎膏次用洗腸當歸丸次用
取血當歸散次用取血黃連丸次日上紅

又神驗治療方
信

白礬
一錢

沒藥
一錢

乳香錢半

各一

右礬硝作一處以少半許入建盞內以信
成塊入中以餘藥塗上以炭大約二斤許

內膏丸服藥忌猪血毒食及去風不可摩

動藥有急水出汙好肉生瘡以和風膏妨

出入以藥塗綿子掩瘡上綿托帛縛日二
次上重十日輕八日若有痔曰連腸若惡

滯腰間疼者用肉桂膏貼腰煩痛以通心

散逐日服次下丁禹散煨姜丸枳殼散落

洗用海蛤散附之乳香膏貼退痔勻腸散

收腸貼項散

治痔久不差變漏不成酒色服藥耳治則

先用紙燃子細看大小淺深即服通真丸

黃耆散以紙燃貼紅肉膏入瘡一日五六

次用乳香膏入作燃子貼瘡口日一次三

五次進藥入瘡內凡取爛肉有血水出方

不進藥須用收腸膏三日後用藥洗三日

用龍骨海蛤散塗以車前散塗口內一日

兩次服藥至三服至取深効後有水出即

治療

五倍子生服二錢麝香酒下
各一

十

治療

白礬四錢

綠礬分一

信兩

右礬硝作一處以少半許入建盞內以信

成塊入中以餘藥塗上以炭大約二斤許

麝香

右用鐵銅鍋先以信在鍋底以白礬覆之
又以綠礬覆之又以硝覆之候成水投乳
香末攪匀候乾如石方出地上出大毒一
宿未方入麝香研加片腦少許用唾調塗

附瘡口上四邊一日三次其瘡自然集落
又枳殼水浸去穰每二片去皮用巴豆一
粒在內線縛入銀石器內米醋高一指煮
乾去豆培為米醋糊丸每服十五丸空心

茶清下或隨津下亦可

腸風下血平胃散加續斷煎服

又方加小麥四十九粒去續斷治痔上瘡膿

蓮蓬等分鍋內慢火微煙薰之

治腸風下血

燒四圍下候沸將乾却覆細末用砂合收

此藥經年大熟黃色則效而不疼赤色則不可用如傳外痔可以白堦減半如速效

可將津液調傳不疼甘草湯調傳此藥久留不損且能不疼次用茅根湯熱洗然後

附藥日夜三五易丸疼發必大腸秘結服寬腸丸併通大使不可燒煙熏入腸反爲

害暑月加百草霜黃丹調附如痔落了肛門腫痛用槐皮煎湯洗用津洗反上磨枳殼附如肛門不收木賊朴硝煎湯附各以

○一次二次即効未落已前黃皮薄荷煎湯唾調附肛門夏月用此尤佳

洗藥
初用此洗

木通

黃芩

黃柏

黑豆

一升

右熱前即洗三次

土

總論傳瘻

傳屍瘻瘍皆心受病氣結血凝故有成蟲

者蓋由飲食酒色憂思喪真遂至此凡蟲為蟲以血凝而氣養之氣血在胞即為正氣氣中即為瘕塊凝在心部即為蟲悉由不正其心憂思業緣所致三屍九蟲之為害治者不可不知其詳九蟲之內而六

急救仙方卷之九

急救仙方卷之十

上清紫庭追瘻仙方論法

老叟自序

傳世已久同知姓名惟存此文不敢妄加其字以復

蟲傳於六代三蟲不傳者謂蛔寸白也六

蟲之內或藏種毒而生或親屬晝染而傳疾之初覺精神恍惚氣微不調切在戒忌酒色調節飲食如或不然五心煩躁心腎夜汗心乃忪悸如此十日頓成骨瘦面黃光潤此其證也妄信邪師祈禳求福醫

用藥延蔓歲時方知病重苟非警戒禍福反掌此人死後兄弟子孫骨肉親屬綿綿相傳以至滅族大抵六蟲一旬之中遍行

四穴周而復始病經遇木氣而生立春一日後方食起三日一食五日一退方其作苦百體有痛蟲之食也退即遷穴醉睡一醉五日其病乍靜俟其退醉之時方可投

符用藥不然蟲熟於符藥之後不能治也一蟲在身中遊十二穴六蟲共占七十二穴一月之中上十日蟲頭向上從心至頭遊四穴中十日蟲頭向內從心至脾遊四穴下十日蟲頭向下從脾至足遊四穴若投符用藥可知如紫蘇苗在汗中蓋蟲性已