

仙傳外科秘方卷之六

造六

波儀原陽子趙生真集
治諸疔瘡經驗品

如疔瘡初出以不變色及不知疼痛按搥不動嵌頂身發寒熱便是此瘡氣疔水疔疔蛇眼石疔雄雌疔爛疔血疔刀疔紅絲魚睛紫硯麻子諸般疔急用團黃藥用臘月間雄豬膽一箇入雄黃京墨薑汁為末入於膽內用此藥塗在瘡上圍之便不走黃元疔發之上便打一針直到痛處便住血出無妨便入仙蟾拔毒取黃藥入於瘡口內即用水泥膏貼之神應膏亦可取黃回時以瘡紅腫為度四圍腫可以放針出血毒黃水如是走黃看血筋到何處以用火針刺斷其血筋立住便不走黃看先黃走入何處結成一塊便是黃者可以黃上便放三五十針等出血及毒氣即用敷黃藥敷出毒矣如是黃走者左過右右過左者難治之必死也瘡上黃上放針無血出如血紫黑者難治亦死也用針取黃不用鐵針只用金銀銅針者初發急服追疔奪

命湯即能內消立效以服飛龍奪命丹亦可後服化毒消腫托裏散以服諸藥皆要大汗出為度

取蟾酥法度

右件將活疥癩蟻眉殺上用手裏拾油紙上或是黃桑葉上便有蟾酥用竹篾貫刺離紙葉上便收於元刮竹篾上插在背陰處經宿酥自然乾收用之

追毒丹取黃去疔頭追膿毒立效

蟾酥一錢乾用 巴豆七粒去殼 若酒化 不去油

白丁香一錢無此 酒浸多 味加巴豆 乾黃

硃砂二錢為末 雄黃二錢 輕粉一錢 黃丹亦可

右總為細末白麩調水為丸如丸不就入酒打麩糊為丸如麥大兩頭尖入於針破

口內用水泥膏貼之後用膏藥及生肌藥

追出膿血毒物又如黑陷漏瘡者四圍

死敗肉不去不生肌者不可治也亦用此

藥追毒去死肌敗肉生新肉愈矣小者用

一粒大者加用之病輕者不必用針只以

手指甲爬動於瘡頂上安此藥水泥膏貼之其瘡即時紅腫為度去其敗肉為妙用之神效立驗

水沉膏

右用白芨末放在盞內用水沉下去用紙

貼之如用膏不可用生肌藥方在前

敷黃藥 蟬蛻 姜蠶

又方 綠瓜葉 連鬚葱白 韭

又方 蒼耳根苗燒灰 白鹽梅灰

藍靛為妙

右總為細末酸醋調塗四圍留瘡口上毒

出如乾再以醋長長潤濕為度如不退加

煎敷藥化毒散血散毒散立效

疔瘡陷頂及膿水不乾者專治疔瘡發背諸

般惡瘡毒以用鐵秀不以多少研為細末

用醋塗疔瘡上須臾疔毒自然凸出膿水

即乾立效

追疔奪命湯秘方速功能內消腫

羌活 獨活 青皮

防風 黃連 赤芍

細辛 甘草節 蟬蛻
 姜蠶 脚連分等
 加河車 澤蘭 金銀
 有膿加首烏 白芷要利 青木香
 大黃 梔子 牽牛
 在脚加 木瓜
 右以咀每服五錢重先將一服加澤蘭用
 紫金銀花兩各一 生姜兩一 同藥搗爛好酒釀
 之熱服不喫酒者水煎為妙然後用酒水
 各一盞半生姜十片煎至熱服汗出為度
 病退減後再加以大黃二錢煎至熱服再
 利一兩腸去餘毒為妙
 此方以藥味觀之甚若不如然效速於神
 驗萬無一失累用累效
 如別有他證出後宜隨證加減治之速效

心煩嘔吐加 甘草節一 豆粉水煎下
 嘔逆惡心加 乳香 豆粉水煎下
 紫河車 老姜未曬一 朱砂五苓散
 心煩嘔吐和伏 母丁香 石蓮 不止
 嘔逆加

用不換金正氣散加人參木香
 嘔不止名喚水手足冷 黃連香薷散吞
 下消暑丸
 手脚冷加 宣木瓜 牽牛
 心煩加 麥門冬 赤芍藥
 山梔子吳 燈草
 潮熱加 北柴胡 黃芩
 淡竹 絲茅根
 眼花加 珠砂 雄黃 麝香少許
 腹脹加 薏苡仁 寒水石
 自利加 白木 白茯苓
 肉豆蔻 櫻栗殼
 腹內痛不止加 楠木香 乳香
 喘嗽加 知母 貝母 蜜少許
 頭疼加 川芎 白芷 葱白
 痛不止加 蘿蔔子 川芎 葱白搗
 碎敷太陽即止
 痰多加 生艾尾葉米醋搗取汁嗽去
 痰
 咽喉痛加 山豆根 靈消根

山梔子 淡竹葉 艾葉 燈草
 大便秘加 赤芍藥 枳殼 大腹皮
 小腑秘加 赤芍藥 赤茯苓
 木通 車前 燈草
 尿血出加 生地黃 車前
 鼻血出加 野紅花 地黃
 藕節 姜皮生用
 瘡不痛 頂不起文三 更不痛不治
 骨蒸加 絲茅根
 無脈服二十四味流氣飲
 秘方加進葉速効內消一生受用矣
 飛龍奪命丹專治疔瘡發背腦疽乳癰疽附
 骨疽一切無頭腫每惡瘡服之便有頭不痛
 者服之便痛已成者服之立愈此乃惡證藥
 中至寶病危者服之立可矣萬無失一此乃
 家傳之秘方一生受用不敢輕洩神速之驗
 即愈立效

蟾酥二錢乾者 血竭一 乳香二
 沒藥二 雄黃二 輕粉二
 膽礬錢 麝香錢 銅綠錢

寒水石一錢 硃砂一錢 腦子半錢

海羊即連殼用之天龍一條酒浸炙

右總為細末將海羊研為泥和前藥為丸如藜豆大如丸不就入酒打麩糊為丸每服二丸先用葱白三寸令痛八嚼爛吐於

手心男左女右將藥丸裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣蓋覆之約人行五里之久再用熱酒數杯以助藥力發熱大汗出為度矣

初覺二九即消如汗不出重者再服二九汗出即放三五日病重者再進二九即愈

如疔瘡走黃過心者難治之汗出冷者亦死矣如病人不能嚼葱搗碎裹藥丸在內熱酒送下瘡在上食後服瘡在下食前服服此藥後忌冷水黃瓜茄子油豬雜魚肉

濕麩一切發風發瘡毒之物不可服之切忌婦人洗換狐臭百發百中此藥治人主

效

歌括

血竭蟾酥輕粉雄黃銅綠硃砂膽寒水

麝香加三七海羊研化專治疔瘡惡毒腦疽發背無差如藜豆大二九加細嚼葱酒送下衣被蓋之汗出返寬救死堪誇神仙傳與世人家奪命金丹無價

治疔瘡癰疽等瘡毒專治能令內消去毒化為黑水從小便出萬無失一此方不得秘又不輕泄謹之慎之寶之可也

乳香 知母 半夏

天花粉可加川山甲 白芨

皂角 銀花各一

右吹咀共計八錢重無灰酒一碗煎至半碗去滓只作一服溫服不得加減用淨搗碎為細末加秋過芙蓉葉一兩重用藥水并花水及數藥於瘡口上如乾再用藥水潤濕過二宿自然消不必用第二服

雄黃九利大疔云毒積

蔚金 雄黃各半 大戟

芒硝各一 巴豆四十粒去殼

右各碾為末麩糊丸藜豆大每服七八丸丸用服用巴豆半粒搗冷白湯吞下如要

打痰用桑白皮杏仁煎湯吞下即行又方大戟為末每服三四錢重茶清調服即行

又方下積 江子二十 木香 丁香 桃仁各

右為細末麩糊為丸藜豆大溫白湯吞下過藥即行

江子一 豆豉一

右為細末麩糊丸每服七丸或九丸白湯送下忌食熱湯物過後用溫白粥米湯可

補 拔黃藥 右用蟾酥飛羅麩為丸如梧桐子大可將一丸放在前舌下即時黃出

百二散奴護心散治瘡疔瘡煩燥手足不主發狂者急宜服之

甘草節 菜豆粉 硃砂各

右為細末甚者水調服

返魂丹 麝香少 雄黃二 蟾酥一

江子七粒去殼
上燒存性
 右為末和酥點舌上三次含化嚥之疔自
 爆切忌用鐵器

仙傳外科秘方卷之六

仙傳外科秘方卷之七

淡儀原陽子趙宜真集

造七

神效治癩瘰癧品

如治癩瘰不問年久月深者先用箍了箍住其瘡以後用艾火從下面兒癩上灸一箇起以等下灸上去灸到母發之處即住每一箇上用大蒜一片貼之灸五七壯止隨灸一箇便用膏藥貼之當時一日一換立見神效

秘傳膏藥

真菜粉二兩半炒用銅鏡子 乳香半兩

檀香半兩 香鴉香鴉亦可半兩 沒藥半兩

膽礬半兩 輕粉好少用

南蛇膽無亦齋香初灸不用

右各為細末諸藥半兩可用豆粉五兩重米醋調成膏攤開油紙上貼之不生肌加

生肌藥即愈矣

五香連翹散治一切積熱結核癩癰癰瘰癧瘡癬

沉香 連翹去毒 乳香
 升麻 大黃生用 桑寄生亦升麻

丁香去核 麝香破者

木通

羌活

甘草

青木香各等

又一方加生黃芪

右吹咀每服四錢重水二盞煮取八分食

後熱服以利下惡毒為度本方有竹瀝芒硝隨證熱輕重當自加減為妙立效用此滓煎湯洗之其瘡立愈矣

治癩癰立效散名六一散益元散初發服此藥即安

滑石一兩

甘草二錢

右先將此末每服一錢半重用米飲調之臨睡進一服半夜時再進一服

又方用荊芥穗 姜蠶

黑牽牛各四錢重

斑蝥二十八隻去頭足翅用糖

右總為細末每服一錢重五更初却用溫酒調服之等惡毒物從小便中如小便無惡物行次日再進一服又不行第三日早五更初先進白糯米稀粥却又再一服更以燈草湯調琥珀末一錢服之以小便內