

葛仙翁肘後備急方卷之一

救卒中惡死方第一

救卒死或先病痛或常居寢卧奄忽而絕皆
是中死救之方

一方取蔥黃心刺其鼻男左女右入七八寸

若使目中血出佳扁鵲法同是後吹耳條

申葛當言此云吹鼻故別為一法

又方令二人以衣壅口吹其兩耳極則易又

可以筒吹之並捧其肩上側身遠之莫臨

死人上

又方以葱葉刺耳耳中鼻中血出者莫性無

血難治有血是候時當捧兩手忽放之須

吏死人自當舉手撈人言痛乃止男刺左

鼻女刺右鼻中令入七八寸餘大效亦治

自縊死與此扁鵲方同

又方以綿漬好酒中須吏置死人鼻中手按

令汁入鼻中并持其手足莫令驚

又方視其上唇裏絃絃者有白如黍米大以

針決去之

又方以小便灌其面數迴即能語此扁鵲方

法

又方取阜葵如大豆吹其兩鼻中噴則氣通

矣

又方灸其脣下宛宛中承漿穴十壯大效矣

又方割雄鷄頸取血以塗其面乾復塗并以

灰營死人一周

又方以管吹下部令數人手吹之氣通則活

又方破白犬以搗心上無白犬白雞亦佳

又方取雄鴨就死人口上斷其頭以熱血濕

口中并以竹筒吹其下部極則易人氣通

下即活

又方取牛馬糞尚濕者絞取汁灌其口中令

入喉若口已禁者以物強發之若不可強

者乃扣齒下若無新者以人溺解乾者絞

取汁此扁鵲云

又方以繩圍其死人肘腕男左女右畢伸繩

從背上大槌度以下又從此灸橫行各半

繩此法三灸各三即起

又方今爪其病人人中取醒不者捲其手灸

下文頭隨年

又方灸鼻人中三壯也

又方灸兩足大指爪甲聚毛中七壯此華他

法一云三七壯

又方灸臍中百壯也

扁鵲法又云斷蛇尾取血飲之并縛蛇以枕

之死人須臾活

又云半夏末如大豆吹鼻中

又方搗女背肩重一錢七開口內喉中以水

苦酒立活

按此前救卒死四方并後尸變事並是魏大

夫傳中正一真人所說扁鵲受長桑公子法

尋此傳出世在葛後二十許年無容知見當

是斯法久已在世故或言楚王或言趙王兼

立語次第亦參差故也

又張仲景諸要方搗薤汁以灌鼻中

又方割丹雄雞冠血管吹內鼻中

又方以雞冠及血塗面上灰圍四邊立起

又方猪脂如雞子大苦酒一升煮沸以灌候

中

又方大豆二七枚以雞子白并酒和盡以吞

之

救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮清

以漬脚令沒踝

救卒死而目閉者騎牛臨面搗薤汁灌之耳

中吹鼻英鼻中立效

救卒死而張目及舌者灸手足兩爪後十四

壯了飲以五毒諸膏散有巴豆者

救卒死而四支不收矢便者馬矢一升水三

斗煮取二斗以洗之又取牛洞一升溫酒

灌口中洞者稀糞也灸心下一寸臍上三

寸臍下四寸各一百壯差

若救小兒卒死而吐利不知是何病者馬矢

一丸絞取汁以吞之無濕者水煮取汁

又有備急三物丸散及裴公膏吹在後備急

藥條中救卒死尤良亦可臨時合用之凡卒

死中惡及尸變皆天地及人身自然陰陽之

氣忽有爭離否隔上下不通偏竭所致故雖

沙死境猶可治而生緣氣未都竭也當備之

時兼有鬼神於其間故亦可以符術而獲濟

者

附方

扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者為

治皆參用此方

搗薑蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒

死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是

也亦此方治之

孫真人治卒死方以皂角末吹鼻中

救卒死尸變方第二

尸變之病卒死而脉猶動聽其耳中循循如

嘯聲而股間暖是也耳中雖然嘯聲而脉動

者故當以尸變救之方

以管吹其左耳中極三度復吹右耳三度

活

又方搗乾薑蒲以一棗核大著其舌下

又方灸鼻人中七壯又灸陰囊下去下部一

寸百壯若婦人灸兩乳中間又云爪刺人

中良久又針人中至齒立起

此亦全是魏大夫傳中扁鵲法即趙太子之

患又張仲景云尸一蹙脉動而無氣氣閉不

通故靜然而死也

以薑蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑

著舌下又云扁鵲法治楚王效

又方別左角髮方二寸燒末以酒灌令入腠

立起也

又方以繩圍其臂腕男左女右繩從大椎上

度下行脊上灸繩頭五十壯活此是扁鵲

秘法

又方熨其兩脇下取竈中墨如彈丸漿水和

飲之須臾三四以管吹耳中令三四入更

手吹之又小管吹鼻孔梁上塵如豆著中

吹之令入差

又方白馬尾二七莖白馬前脚目一枚合燒

之以苦酒丸如小豆開口吞二丸須臾服

一丸

又方針百會當鼻中入髮際五寸針入三分

補之針足大指甲下肉側去甲三分又針

足中指甲上各三分大指之內去端韭葉

又針手少陰銳骨之端各一分

又方灸臍中穴二十八壯

救卒客忤死方第三

客忤者中惡之類也多於道門外得之今人心腹絞痛脹滿氣衝心胃不即治亦殺人救之方

灸鼻人中三十壯令切鼻柱下也以水漬粳米取汁一二升飲之口已禁者以物強

發之

又方搗墨水和服一錢七

又方以銅器若瓦器貯熱湯器著腹上轉外者撤去衣器親肉大冷者易以熱湯取愈

則止

又方以三重衣著腹上銅器著衣上稍稍少許茅於器中燒之茅盡益之勿頃多也取

愈乃止

又方以繩橫度其人口以度其臍去四面各一處灸各三壯令四火俱起差

又方橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯

又方真丹方寸七蜜三合和服口噤者折齒下之

扁鵲治忤有救卒符并服鹽湯法恐非庸世

所能故不載而此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之已死者

者 搗生菖蒲根絞取汁含之立差 卒忤停尸不能言者桔梗燒二枚末之服

又方末細辛桂分等內口中 又方鷄冠血和具末丸如小豆內口中與三四枚差

若卒口噤不開者末生附子置管中吹內舌下即差矣

又方人血和具末如梧桐子大二九折齒納喉中令下

華佗卒中惡短氣欲死灸足兩母指上甲後聚毛中各十四壯即愈未差又灸十四壯

前救卒死方三七壯已有其法

又張仲景諸要方麻黃四兩杏仁七十枚甘草一兩以水八升煮取三升分合咽之通

治諸感忤 又方韭根一把烏梅二十箇菜菔半斤以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生

沉者死煮得三升與飲之 又方桂一兩生薑三兩梔子十四枚豉五合搗以酒三升攪微煮之味出去滓頓服取

差 飛尸走馬湯巴豆二枚杏仁二枚合綿纏椎

令碎著熱湯二合中指捻令汁出便與飲之炊間頓下飲差小量之通治諸飛尸鬼

擊 又有諸丸散並在備急藥中客者客也忤者犯也謂客氣犯人也此蓋惡氣治之多愈雖

是氣來鬼鬼毒厲之氣忽逢觸之其衰歇故不能如自然惡氣治之入身而侵尅藏府經

絡差後猶宜更為治以消其餘勢不爾坐終為患今有時輒發

附方 外臺秘要治卒客忤停尸不能言細辛桂心

等分內口中 又方燒桔梗二兩末米飲服仍吞麝香如大

豆許佳 廣利方治卒中客忤垂死麝香一錢重研和

醋二合服之即差

治卒得鬼擊方第四

鬼擊之病得之無漸卒著如人力刺狀胃脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血二名鬼排治之方

灸鼻下人中一壯立愈不差可加數壯

又方升麻獨活杜桂分等末酒服方寸七立愈

愈

又方灸臍下一寸二壯

又方灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取差

又方熟艾如鴨子大三枚水五升煮取二升頓服之

頓服之

又方鹽一升水二升和攪飲之并以冷水翼之勿令即得吐須臾吐即差

又方以粉一撮著水中攪飲之

又方以淳酒吹內兩鼻中

又方斷白犬一頭取熱大血一升飲之

又方割鷄冠血以溼口中令一咽仍破此鷄

以瑜心下冷乃弃之於道邊得鳥鷄爛佗

妙

又方牛子矢一升酒三升煮服之大牛亦可

用之

又方刀鞘三寸燒末水飲之

又方燒鼠矢末服如黍米不能飲之以少水

知內口中

又有諸丸散並在備急藥條中今平實見人

忽有被鬼神所擺拂者或犯其行伍或遇相

觸突或身神散弱或愆負所貽輕者因而獲

免重者多見死亡猶如燕簡筆事非為虛也

必應死亦不可要自不得不救爾

附方

古今錄驗療妖魅貓鬼病人不肯言鬼方鹿

角屑搗散以水服方寸七即言實也

治卒驚寐不寤方第五

卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其

踵及足拇指甲際而多唾其面即活又治之

方

末卑角管吹兩鼻中即起三四日猶可吹

又以毛刺鼻孔中男左女右展轉進之

又方以蘆管吹兩耳并取病人髮二七莖作

繩納鼻孔中割雄鷄冠取血以管吹入咽

喉中大效

又方末竈下黃土管吹入鼻中末雄黃并桂

吹鼻中並佳

又方取井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼

其姓名即便起也

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取

汁灌於口中

又方以鹽湯飲之多少約在意

又方以其人置地利刀畫地從肩起男左女

右今周面以刀鋒刺病人鼻今入一分急

持勿動其人當鬼神語求哀乃問阿誰何

故來當自乞去乃以指滅向所畫地當肩

頭數寸令得去不可不具詰問之也

又方以瓦甑覆病人面上使人疾打破甑則

寤

又方以牛蹄或馬蹄臨魔人上亦可治卒死

青牛尤佳

又方擣雄黃細篩管吹納兩鼻中桂亦佳

又方菖蒲末吹兩鼻中又末內舌下

又方以甌帶左索縛其肘後男左女右用餘稍急絞之又以麻縛脚乃詰問其故約勒解之今一人坐頭守一人於戶內呼病人姓名坐人應曰諾在便蘇

卒感不覺灸足下大指聚毛中二十一壯

人喜魔及惡夢者取火灰著履中合枕

又方帶雄黃男左女右

又方灸兩足大指上聚毛中灸二十壯

又方用真麝香一子於頭邊

又方以虎頭枕尤佳

辟魔寐方取雄黃如棗核繫左腋下令人終身不魔寐

又方真赤蜀方一赤以枕之

又方作犀角枕佳以青木香內枕中并帶

又方履治卒魔寐久書此符於紙燒令惡以

少水和之內死人口中懸鑑死者耳前打之喚死者名不過半日即活

魔卧寐不寤者皆魂魄外遊為邪所執錄欲還未得所忌火照火照遂不復入而有燈光中魔者是本由明出但不反身中故耳

附方

千金方治鬼魔不悟卑焚末刀圭起死人

治卒中五尸方第六

五尸者飛尸也今所載方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胃旁攻兩脇或礫塊涌

起或牽引腰脊兼治之方十三

灸乳後三寸十四壯男左女右不止更加壯數差

又方灸心下三寸六十壯

又方灸乳下一寸隨病左右多其壯數即差

又方以四指尖其痛處下灸指下際數壯令人痛上爪其鼻人中又爪其心下一寸多其壯取差

又方破鷄子白頓吞七枚不可再服

又方理當陸根熬以囊貯更番熨之冷復易

雖有五尸之名其例皆相似而有小異者飛尸者走皮膚洞穿藏府每發刺痛變作無常也連尸者附骨入肉攻擊無厭每發不可得也近見屍喪聞哀哭便作也風尸者淫瀝四肢不知痛之所在每發昏恍得風雷便作也沉

尸者纏結藏府衝心膈每發切過寒令便作也尸注者舉身沉重精神銷難常覺昏廢勞節氣散變軀致大惡凡五尸即身中屍鬼此一餘別有治後變也

世徒能用今復撰其經要以救其敵方

雄黃一兩大蒜一兩令相和似彈丸許內二合熱酒中服之須臾差未差更作已有痛者常畜此藥也

又方乾薑桂分等末之鹽孔指撮熬令青末合水服之即差

又方搗蕪荊子蜜丸服如胡豆二九日三

又方粳米二升水六升煮一沸服之

又方猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相和頓服即差

又方掘地作小坎水滿中熟攪取汁服之

又方取屋上四角茅內銅器中以三赤布覆腹著露布上燒茅令熱墮痛迫速蹠下痒即差若瓦屋則取四角柱燒之亦得極大神良者也

又方桂一赤薑一兩巴豆三枚合搗末苦酒和如泥以傳尸處燥即差

又方烏白椴剉二升煮令濃去滓煎汁凡五升則入水一兩服五合至一升良
又方忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如鷄子一枚日二三服佳也
又方燒亂髮熬杏仁等分搗膏和丸之酒服

桐子大三九日五六服

又方龍骨三分藜蘆二分巴豆一分搗和井

花水服如麻子大如法丸

又方漆葉暴乾搗末酒服之

又方鼈肝一具熟煮切食之令盡亦用蒜薑

又方斷鬣頭燒末水服可分為三度當如肉

者不盡後發更作

又方雄黃一分梔子十五枚芍藥一兩水三升煮取一升半分再服

又方梔子二七枚燒末服

又方乾薑附子各一兩桂二分巴豆三十枚

去心並生用搗篩蜜和搗萬杵服二丸如

小豆大此藥無所不治

又飛尸入腹刺痛死方凡犀角射罔五注丸

並是好藥別在大方中治卒有物在皮中如

蝦蟇宿昔下入腹中如枉不動搖掣痛不可堪過數日即斃人方

巴豆十四枚龍膽一兩半夏土瓜子各一兩桂一斤半合搗碎以兩布囊貯蒸熱更番以熨之亦可煮飲少服之

此本在雜治中病名曰陰尸得者多死

治尸注鬼注方第七

尸注鬼注病者葛云即是五屍之中尸注又

扶諸鬼邪為害也其病變動乃有三十六種

至九十九種大略使人寒熱淋瀝恍惚默然

不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就

頓滯以至於死死後復傳之旁人乃至滅門

覺知此候者便宜急治之方

取桑樹白皮曝乾燒為灰得二斗許善觀

中蒸令氣浹便下以釜中湯三四斗淋之

又淋凡三度極濃止澄清取二斗以漬赤

小豆二斗一宿曝乾乾復漬灰汁盡止乃

濕蒸令熟以羊肉若鹿肉作羹進此豆飯

初食一升至二升取飽滿微者三四斗愈

極者七八斗病去時體中自覺疼痛淫淫

或若根本不拔重為之神驗也

又方桃人五十枚破研以水煮取四升一服

盡當吐吐病不盡三兩日更作若不吐非

注

又方杜衡一兩莖一兩人參半兩許參子二

七枚松蘿六銖赤小豆二七枚搗末散平

且溫服方寸七晚當吐百種物若不盡後

更服之也

又方賴肝一具陰乾搗末水服方寸七日三

一具未差更作姚云神良

又方朱砂雄黃各一兩鬼臼茵草各半兩巴

豆四十枚去心皮蜈蚣兩枚搗蜜和丸服

如小豆不得下服二九亦長將行之姚氏

燒髮灰熬杏仁紫色分等搗如脂猪脂和

酒服梧桐子大日三服差

又有華他狸骨散龍牙散羊脂丸諸大藥等

並在大方中及成帝所受淮南丸並療症易

滅門女子小兒多注車注船心悶亂頭痛吐

有此疾者宜辟方

車前子車下李根皮石長生

兩分等麤搗作方囊貯半合繫衣帶及頭
若注船下暴慘以和此共帶之又臨入船
刻取此船自燒作屑以水服之

附方

子母秘錄治尸注燒亂髮如鷄子大為末水

服之差

食醫心鏡主傳尸鬼氣咳嗽痰癰注氣血氣

不通日漸羸瘦方桃人一兩去皮尖并碎
以水一升半煮汁著米煮粥空心食之

治卒心痛方第八

治卒心痛桃白皮煮汁宜空腹服之

又方桂末若乾薑末二藥並可單用溫酒服

方寸七須更六七服差

又方驢矢絞取汁五六合及熱頓服立定

又方東引桃枝一把切以酒一升煎取半升

頓服大效

又方生油半合溫服差

又方黃連八兩以水七升煮取一升五合去

滓溫服五合每日三服

又方當戶以坐若男子病者令婦人以一杯

水以飲之若婦人病者令男子以一杯水
以飲之得新汲水尤佳又以蜜一分水二
分飲之益良也

又方敗布裹鹽如彈丸燒令赤末以酒一盞

服之

又方煮三沸湯一升以鹽一合攪飲之若無

火作湯亦可用水

又方閤氣急之數十度并以手大指按心下

宛宛中取愈

又方白艾成熟者三升以水三升煮取一升

去滓頓服之若為客氣所中者當吐之虫
物

又方苦酒一椀鷄子一枚著中合攪飲之好

酒亦可用

又方取藍下熱灰篩去炭分以布囊貯令灼

灼爾便更番以熨痛上冷更熱熱

又方蒸大豆若煮之以囊貯更番熨痛處冷

復易之

又方切生薑若乾薑半升以水二升煮取一

升去滓頓服

又方灸手中央長指端三壯

又方好桂削去皮搗篩溫酒服三方寸匕不

差者須更可六七服無桂者末乾薑佳

又方積度病人口折之以度心厭下灸度頭

三壯

又方盡地作五行字掃中央土以水一升攪

飲之也

又方吳茱萸二升生薑四兩豉一升酒六升

煮三升半分三服

又方人參桂心梔子擘甘草炙黃芩各一兩

水六升煮取二升分三服奇效

又方桃人七枚去皮尖熟研水合頓服良亦

可治三十年患

又方附子二兩炮乾薑一兩搗蜜丸服四九

如梧子大日三

又方吳茱萸一兩半乾薑淮上桂心一兩白

朮二兩人參橘皮椒去開口及子汗甘草

炙黃芩當歸桂梗各一兩附子一兩半炮

搗篩蜜和為丸如梧子大日三稍加至十

丸十五丸酒飲下飯前食後任意效驗

又方桂心八兩水四升煮取一升分三服
又方苦參三兩苦酒升半煮取八合分再服
亦可用無蒸者生亦可用

又方龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服
又方吳茱萸五合桂一兩酒二升半煎取一

升分二服效
又方吳茱萸二升生薑四兩或一升酒六升
煮取二升半分為三服

又方白鷄一頭治之加食泔水三升煮取二
升去鷄煎汁取六合內苦酒六合入真珠
一錢復煎取六合內末麝香如大豆二枚
頓服之

又方桂心當歸各一兩梔子十四枚搗為散
酒服方寸七日三五服亦治又心病發作
有時節者也

又方桂心二兩烏頭一兩搗篩蜜和為丸一
服如梧子大三九漸加之

暴得心腹痛如刺方苦參龍膽各二兩升麻
梔子各三兩苦酒五升煮取二升分二服
當大吐乃差

治心疝發作有時激痛難忍方真射筒吳茱
萸分等搗末蜜和丸如麻子服二九日三
服勿喫熱食

又方灸心鳩尾下一寸名巨關及左右一寸
並百壯又與物度頭及度脊如之令正相
對也凡灸六處

治久患常痛不能飲食頭中疼重方烏頭六
分椒六分乾薑四分搗末蜜丸酒飲服如
大豆四九稍加之

又方半夏五分細辛五分乾薑三分人參三
分附子一分搗末苦酒和丸如梧子大酒
服五九日三服

治心下牽急懊痛方桂三兩生薑三兩枳實
五枚水五升煮取三升分三服亦可加水
二兩膠飴半斤

治心肺傷動冷痛方桂心二兩猪腎二枚水
八升煮取二升分三服

入方附子二兩乾薑二兩蜜丸服四九如梧
子大日三服
治心痹心痛方蜀椒一兩熬令黃末之以狗

心血丸之如梧子服五九日五服

治心下堅痛大如碗邊如旋林名為氣分飲
水所結方枳實七枚炙末三兩水一斗煮
取三升分為三服當稍軟也

若心下百結積來去痛者方吳茱萸末一升
真射筒如彈丸一枚合搗以鷄子白和丸
丸如小豆大服二九即差

治心痛多唾似有虫方取六畜心生切作十
四齒刀縱橫各割之以真丹一兩粉肉割
中二悉吞之入雄黃射香佳

飢而心痛者名曰飢疝龍膽附子黃連分等
搗篩服一錢七日三度服之

附方

藥性論主心痛中惡或連腰膈者

益如鷄子大青布裹燒赤內酒中頓服當

吐惡物

拾遺序延胡索止心痛末之酒服

聖惠方治久心痛時發不定多吐清水不下
飲食以雄黃二兩好醋二升漫火煎成高
用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七九薑湯

下

又方治九種心痛妨用桂心一分為末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立效

又方治寒疝心痛四肢逆冷全不飲食用桂心二兩為散不計時候熱酒調下一錢七

外臺秘要治卒心痛乾薑為末水飲調下三十一

錢

又方治心痛當歸為末酒服方寸匕

又必效治峭心痛熊膽如大豆和水服大效

又方取鱧鱺魚淡炙令熟與患人食一二枚

永差飽食彌佳

經驗方治四十年心痛不差黍米淘汁溫服

隨多少

經驗後方治心痛薑黃一兩桂蘘三兩為末

醋湯下一錢七

簡要濟眾治九種心痛及腹腸積聚滯氣筒

子乾漆二兩搗碎炒煙出細研醋煮麩糊

和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒

下醋湯亦得無時服

姚和衆治卒心痛郁李人三七枚爛嚼以新

汲水下之飲溫湯尤妙須臾痛止却煎薄
鹽湯熱呷之

兵部手集治心痛不可忍十年五年者隨手
效以小蒜醃醋煮頓服之取飽不用著鹽

治卒腹痛方第九

治卒腹痛方書舌上作風字又畫紙上作兩

蜈蚣相交吞之

又方搗桂末服三寸七苦酒人參上好乾薑

亦佳

又方粳米二升以水六升煮二七沸飲之

又方食鹽一大把多飲水送之忽當吐即差

又方掘土作小坎水滿坎中熱攪取汁飲之

又方令人騎其腹滿臍中

又方米粉一升水二升和飲

又方使病人伏卧一人跨上兩手抄舉其腹

今病人自縱重輕舉抄之令去床三尺許

便放之如此二七度止括取其脊骨皮深

取痛引之從龜尾至頂乃止未愈更為之

又方令卧枕高一尺許挂膝使腹皮蹶氣入

胃令人扒其臍上三寸便愈能乾咽吞氣

數十通者彌佳此方亦治心痛此即伏氣
治卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗
出欲死方搗沙參末篩服方寸七立差
此本在雜治中謂之寒疝亦名陰疝此治不
差可服諸利丸下之作走馬湯亦佳

治寒疝腹痛飲食下唯不覺其流行方椒二

合乾薑四兩水四升煮取二升去滓內飴

一斤又煎取半分再服數服之

又方半夏一升桂八兩生薑一升水六升煮

取二升分為二服

治寒疝來去每發絞痛方吳茱萸三兩生薑

四兩豉二合酒四升煮取二升分為二服

又方附子一枚椒二百粒乾薑半兩半夏十

枚大棗三十枚粳米一升水七升煮米熟

去滓一服一升令盡

又方肉桂一斤吳茱萸半升水五升煮取一

升半分再服

又方牡蠣甘草桂各二兩水五升煮取一升

半再服

又方宿烏雞一頭治如食法生地黃七斤合

細剉之著甌蔽中蒸銅器承須取汁清且服至日晡令盡其間當下諸寒癖訖作白粥漸食之火疝者下三劑

附方

博濟方治冷熱氣不和不思飲食或腹痛疝

刺山梔子川烏頭等分生搗為末以酒糊丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香蔥酒任下二十九

經驗方治元藏氣發又冷腹痛虛瀉

應急大效王粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已

上衮細研以蒸餅為丸如菽豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

子母秘錄治小腹痛青黑或亦不能喘苦參

一兩醋一升半煎八合分二服

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出

以丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢七佳

治心腹俱痛方第十

治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕方取梔子十四枚豉七合以水二升先煮豉取一升

二合絞去滓內梔子更煎取八合又絞去滓服半升不愈者盡服之

又方浣小衣飲其汁一二升即愈

又方桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無桂者著乾薑亦佳

又方烏梅二十七枚以水五升煮一沸內大錢

二十七枚煮得二升半強人可頓服羸人可分為再服當下便愈

又方茱萸二兩生薑四兩豉三合酒四升煮取二升分為三服即差

又方乾薑一兩巴豆二兩搗蜜丸一服如小豆二丸當吐下差

治心腹相連常脹痛方狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸如梧子大日一服一九二日二

丸三日後服三丸再一丸至六日服三丸自一至三以常服即差

又方吳茱萸一合乾薑四分附子細辛人參各二分搗篩蜜丸如梧子大服五九日三服

凡心腹脹痛若非中惡霍亂則是皆宿結冷熱

所為今此方可採以救急差後要作諸大治以消其根源也

附方

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以鹽五合水一升煎令消頓服自吐下

食出即定不吐更服

孫真人方治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

十全方心脾痛以高良薑細剉炒杵末米飲調下一錢七立止

治卒心腹煩滿方第十一

治卒心腹煩滿又胃脇痛欲死方以熱湯令灼灼爾瀆手足復易秘方

又方青布方寸鹿角三分亂髮灰二錢七以水二升煮令得一升五合去滓盡服之

又方劉蕪以根濃煮取汁服三升

又方取比輪錢二十枚水五升煮取三沸日三服

又方搗香菜汁服一二升水煮乾薑亦佳

又方即用前心痛支子豉湯法差

又方黃芩一兩杏仁二十枚牡蠣一兩水三升煮取一升頓服

治厥逆煩滿常欲嘔方小豆桂細辛乾薑椒各二兩附子二兩炮搗蜜和丸服如桐子大四丸

治卒吐逆方灸乳下一寸七壯即愈

又方灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中央長指爪下一壯愈

此本雜治中其病亦是痰壅霍亂之例兼宜依霍亂條法治之入卒在此上條患者亦少皆因他病兼之耳或從傷寒未復或從霍亂吐下後虛燥或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各循其本源為治不得專用此法也

附方

千金方治心腹脹短氣以草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯下半錢

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿方厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑

為度搗篩如麴以陳米飲調下二錢七日三服良亦治反胃止瀉甚妙

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胃滿悶

不蛀阜角去皮子塗好醋炙令焦為末一

錢七巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常服消酒食

梅師方治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下部中吟即易之

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時令一棗大燕津

葛仙翁肘後備急方卷之一

葛仙翁肘後備急方卷之二

治卒霍亂諸急方第十二

陸三

凡所以得霍亂者多起飲食或飲食生冷雜物以肥膩酒醢而由風履濕薄衣露坐或夜卧夫覆之所致

初得之便務令以炭火布其所卧下大熱滅之又並蒸微絮若衣絮自苞冷易熱者亦可燒地令熱水沃敷薄布席卧其上厚覆之亦可作灼灼熱湯著甕中漬足令至膝并銅器貯湯以著腹上衣藉之令復易亦可以熨斗貯火著腹上如此而不淨者便急灸之但明察次第莫為亂灸須有其病乃隨病灸之未有病莫預灸灸之雖未即愈要為不復死矣莫以灸不即而止灸霍亂艾丸若不大壯數亦不多本方言七壯為可四五十無不便火下得活服舊方用理中丸及厚朴大豆豉通脉半夏湯先葷所用藥者難得今但既良灸之法及單行數方用之有效不減於貴藥已死未火者猶可灸